

GRAGEAS

MICTUROL® SEDANTE FUERTE



COMPOSICIÓN

Cada gragea contiene:

Sulfametizol (D.C.I.).....	250 mg
Fenazopiridina (D.C.I.) clorhidrato.....	50 mg
Excipientes: Lactosa, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica tipo A, povidona, glicerina, gelatina, almidón de maíz, estearato magnésico, carbonato cálcico, talco, dióxido de titanio (E-171), opalux yellow (E-102/E-171), goma arábiga, carboximetilcelulosa sódica, eudragit E-100, opaglos 6000 y 332,55 mg de sacarosa.	

PROPIEDADES

El espectro antibacteriano del sulfametizol abarca un número importante de gérmenes habituales en las infecciones urinarias (*Escherichia coli*, *Proteus mirabilis* y *P. vulgaris*, *Klesbsiella-Enterobacter* y *Staphylococcus aureus*, entre otros). Se absorbe en forma rápida y completa; apenas un 5% de la dosis administrada se metaboliza por acetilación y el sulfametizol activo se elimina en forma rápida y a concentraciones elevadas por orina. Su rápido aclaramiento renal hace que la acumulación en tejidos sea baja y su alta solubilidad en orina disminuye el riesgo de cristaluria observado con otras sulfonamidas.

La fenazopiridina se excreta en forma activa por las vías urinarias y ejerce un efecto tópico selectivo sobre su mucosa, aliviando el dolor y la disuria.

INDICACIONES

Infecciones urinarias por gérmenes sensibles que se acompañan de dolor miccional o disuria: cistitis, pielitis, pielonefritis, piuria.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO

Vía oral. Adultos.

Dosis media: 1 gragea, 3-4 veces al día. Administrar preferentemente con leche u otro alimento.

Mientras dure el tratamiento se aconseja ingerir abundante cantidad de agua.

CONTRAINDICACIONES

Alergia a los componentes. Insuficiencia renal grave. Embarazo. Madres en periodo de lactancia. Prematuros y niños menores de un mes. Pacientes con deficiencia en glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

PRECAUCIONES

Administrar con precaución en insuficiencia hepática grave y hemopatías. Alergia a antidiabéticos orales. Asegurar una buena ingestión de líquidos.

Advertencias: Es normal una coloración rojiza de la orina durante el tratamiento. Las posibles manchas de la ropa interior pueden eliminarse tratándolas inicialmente con hidrosulfito sódico (ditionito sódico) y lavando después la prenda varias veces con agua caliente.

"Estas especialidades contienen lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas debe consultar a su Médico".

Micturol Sedante Fuerte contiene 332,55 mg de sacarosa por gragea, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En ocasiones, pueden observarse molestias digestivas (por lo que se aconseja ingerir las grageas con un poco de alimento), reacciones alérgicas, cefaleas y malestar y, raramente, leucopenia, metahemoglobinemia y hemolisis.

INTERACCIONES

Debe evitarse la administración simultánea de metenamina o hipoglucemiantes orales, así como anti-coagulantes orales, fenitoína y metotrexato.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

La sobredosificación se manifiesta, principalmente, como un cuadro de epigastralgia, vómitos, mareos, metahemoglobinemia y petequias, entre otros síntomas. Deberá tratarse con vaciamiento gástrico, aporte hidroiónico, azul de metileno 1-2 mg/kg i.v. o ácido ascórbico oral, 200 mg, y medidas sintomáticas.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Envase de 20 grageas.

OTRAS PRESENTACIONES

Micturol Sedante, envase de 20 grageas.

CON RECETA MÉDICA.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ABBOTT LABORATORIES, S.A. Josefa Valcárcel, 48 - 28027 Madrid.