

Loción - Shampoo

Venta Libre - Industria Argentina

nopucid[®] **COMPUESTO** Deltametrina Piperonil Butóxido

Fórmulas:

Loción: Cada 100 ml contiene: Deltametrina 0,020 g; piperonil butóxido 0,100 g. Exc.: Arkopal N° 100 5,800 g; B.H.T. 0,0085 g; formol 37 % 0,525 g; alcohol etílico 96° 0,806 g; acetona 0,791 g; perfume colonia manzanas verdes 0,508 g; ciclohexanona 0,497 g; colorante verde 735 0,150 mg (compuesto por: tartrazina 0,1185 mg - azul brillante 0,0315 mg); ácido clorhídrico pH 5,0-5,5; agua purificada c.s.

Shampoo: Cada 100 ml contiene: Deltametrina 0,020 g; piperonil butóxido 0,100 g. Exc.: Lauril eter sulfato de sodio 19,00 g; formol 37 % 0,540 g; cloruro de sodio 2,00 g; arkopal N° 100 5,60 g; B.H.T. 0,0085 g; alcohol etílico 96° 0,806 g; acetona 0,791 g; perfume colonia manzanas verdes 0,50 g; ciclohexanona 0,497 g; dietanolamina de ácidos grasos de coco 1,00 g; colorante verde 735 0,35 mg (compuesto por: tartrazina 0,2765 mg - azul brillante 0,0735 mg); ácido clorhídrico pH 5,0-5,5; agua purificada c.s.

Este medicamento contiene en su formulación tartrazina como colorante.

Indicaciones:

Ectoparasitícida de uso externo para el tratamiento de la pediculosis del cuero cabelludo.

Acción terapéutica:

Pediculicida. Actúa sobre los piojos y las liendres más expuestas.

Modo de empleo:

Se recomienda el siguiente esquema:

Día 1 Noche		• Aplicar Nopucid compuesto loción mediante masaje firme, con el objeto de impregnar el cabello y el cuero cabelludo. Dejar actuar la loción durante toda la noche, sin enjuagar.
Día 2 Mañana		• Al día siguiente, por la mañana lavar el cabello con Nopucid compuesto shampoo.
		• Dejar actuar Nopucid compuesto shampoo durante 10 minutos.
		• Enjuagar el cabello (puede emplear una crema enjuague).
		• Con el cabello aún húmedo, pasar el peine extrafino para facilitar el arrastre de los huevos o liendres. El peinado debe efectuarse desde la raíz a la punta del cabello.
Día 2 Noche		• Repetir el tratamiento del Día 1 Noche
Día 3 Mañana		• a) Repetir el tratamiento del Día 2 Mañana b) En los días subsiguientes se aconseja examinar minuciosamente la cabeza del paciente infestado. Una sola aplicación suele ser efectiva, sin embargo, en caso de detectar la presencia de piojos vivos y/o liendres, repetir el tratamiento a los 7 ó 14 días de la primera aplicación.

Medidas complementarias

Los piojos o sus huevos no sólo están en la cabeza, sino que también los podemos hallar por períodos cortos (2 a 3 días) en diversos lugares de alto riesgo epidémico (escuelas, clubes, piletas de natación, areneros, colonias de vacaciones, etc.) e incluso en objetos de uso personal y ropas que están en contacto con el infestado.

Efectos secundarios:

En individuos sensibles puede observarse irritación, prurito (picazón), ardor, eritema (enrojecimiento de la piel) a nivel de cuero cabelludo. Dificultad respiratoria o crisis asmática en personas predispuestas. No se ha descripto que la aplicación tópica (en la cabeza) de **Nopucid compuesto loción y/o shampoo** produzca efectos secundarios en el organismo.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. Embarazo. Lactancia. Menores de 2 años.

Precauciones y advertencias:

- El **shampoo** y la **loción Nopucid compuesto** son de **USO TÓPICO EXTERNO** (en la cabeza) exclusivo.
- **Evitar el contacto con los ojos, mucosas (labios), heridas y quemaduras.** En caso de producirse el contacto accidental del producto con los ojos, mucosas, heridas o quemaduras, lavar con abundante agua fría. Consultar al médico si persiste la irritación.
- Si hubiere infección o lesiones a nivel del cuero cabelludo, consultar al médico antes de utilizar el producto. Debe tenerse en cuenta que en la pediculosis son frecuentes las lesiones por rascado.
- Recordar que es conveniente utilizar este producto en lugares bien ventilados.
- **No debe ingerirse.** En caso de ingestión accidental del producto, consultar al médico, hospital o Centro de Toxicología más cercano.

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital Posadas: Tel.: (011) 4658-7777/4654-6648.

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.

Información para el paciente:

Las liendres (huevos) suelen ser más visibles cerca del cuello y detrás de las orejas, pero pueden encontrarse en cualquier parte de la cabeza. Todas las prendas en contacto con el paciente deben ser bien lavadas con agua bien caliente ó en lavarropas durante 20 minutos. Las que no puedan ser lavadas, dejar en bolsa plástica cerrada por 2 semanas. Debido a que ninguna piretrina es totalmente ovicida (no actúa sobre todas las liendres sino sobre las más expuestas) y a pesar de la actividad residual de las mismas, es necesario remover las liendres mecánicamente con un peine fino y en ocasiones repetir el tratamiento a los 7 ó 14 días del primero. Desinfectar peines y cepillos con agua hirviendo durante 5 minutos por lo menos. Evaluar al grupo de convivencia del paciente, ya que el tratamiento es más efectivo simultáneamente en todas las personas infestadas.

Ante cualquier duda consulte a su médico.

Presentaciones

Contenido

Nopucid Compuesto loción	120 ml
Nopucid Compuesto shampoo	120 ml

Otras presentaciones

Contenido

Nopucid mc loción	120 ml
-------------------	--------

Importante: Si usted compró sólo **Nopucid Compuesto Loción**, luego de aplicarlo puede lavar el cabello con su **shampoo** habitual. Y si lo prefiere, puede utilizar cualquier crema de enjuague. La **loción** permite intensificar el tratamiento gracias a sus componentes, **Deltametrina** y **PBX**, y a su mayor tiempo de exposición.

El **Shampoo** brinda control y suavidad. Además es ideal para complementar la acción de las otras presentaciones de **Nopucid**.

Conservar en luga seco y fresco.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Especialidad Medicinal Aut. por el M.S. Certif. Nro. 38.691.

Elaborado en Calle 3 s/Nro. esquina 103, Pque. Industrial Norte, San Luis, Pcia. de San Luis.

Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Isaac J. Nisenbaum, Farmacéutico.

Última revisión: Noviembre/1997 501405-00 I-cs-i