

# Lenacelga

Poivo mojabie (WP)

HERBICIDA

HERBICIDA RESIDUAL DE ABSORCIÓN RADICULAR  
EN REMOLACHA AZUCARERA, ROSAL, CLAVEL, ESPINACAS Y ACELGA

## COMPOSICIÓN:

Lenacilo 80% p/p (800 g/kg)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el n° 23336/15

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

DISTRIBUIDO POR:



Com. Agr. y Fit., KARYON, S.L.

Apartado de Correos n° 50

Ciudad Santo Domingo - 28120 Madrid

Tlfn. 916571269

REGISTRADO POR:

HERMOO BELGIUM N.V.



Lichtenbergleaan 2045

B-3800 - St. Truiden, BELGICA

+32 11 686866

CONTENIDO NETO  
**1**  
KILO



Lote de fabricación n°: ver envase

Fecha de fabricación: ver envase

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA

## ÁREA DE INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S13: Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos.
- S22: No respirar el polvo.
- S24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel.
- S45: EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).

### RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

#### • Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza mas baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Controle la respiración. Si fuese necesario, respiración artificial.
- Traslada al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SÓLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.  
Teléfono (91) 562 04 20

N



PELIGROSO  
PARA EL MEDIO  
AMBIENTE

- R50-53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

### Condicionamiento preventivo de riesgos:

#### Mitigación de riesgos medio ambientales:

Mamíferos: A  
Aves: A  
Peces: A

**SP1:** NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

#### GESTIÓN DE ENVASES:

ESTE ENVASE, UNA VEZ VACÍO DESPUÉS DE UTILIZAR SU CONTENIDO ES UN RESIDUO PELIGROSO, POR LO QUE EL USUARIO ESTÁ OBLIGADO A ENTREGARLO EN LOS PUNTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, SIGFITO.

## ÁREA FITOTERAPEÚTICA

**CARACTERÍSTICAS:** LENACELGA es una formulación herbicida residual con acción selectiva en remolacha azucarera, rosal, clavel, espinacas y acelga. La sustancia activa que lo compone, lenacilo, se caracteriza por ser absorbida por vía radicular e interferir la diferenciación celular dificultando la síntesis del ARN e impidiendo la función clorofílica de las malas hierbas.

### APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS:

CULTIVO	MALAS HIERBAS	DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Remolacha azucarera Rosal Clavel Espinacas Acelga	Dicotiledóneas anuales y gramíneas anuales	Aplicar al suelo en pulverización a baja presión. Dosis: 0.6 - 0.8 kg/ha Malas hierbas en preemergencia.

### MODO DE APLICACIÓN

LENACELGA se aplica mediante pulverización al suelo a baja presión utilizando unos 500 lts de caldo por hectárea y dosificando el producto a razón de 0.6 - 0.8 kgs/ha.

La aplicación se realizará en Remolacha azucarera, en presiembra incorporado, preemergencia y postemergencia a partir del estado de 4 hojas.

Espinaca y acelga, aplicar en preemergencia del cultivo.

Clavel y rosal, aplicar en postemergencia del cultivo.

### CONDICIONAMIENTO FITOTERAPEÚTICO

Las dosis más altas se deberán dar en los suelos más pesados y las bajas en los más ligeros. No debe aplicarse este producto en terrenos arenosos por la posibilidad de causar daños en los cultivos. Cuando el producto se aplique mezclado con otros herbicidas se podrán rebajar las dosis entre un 10 y un 20%.

No aplicar otros herbicidas residuales dentro de los 3 meses anteriores o posteriores a la aplicación de lenacilo. Los cultivos siguientes no deben implantarse al menos hasta 4 meses después del tratamiento realizando previamente una labor de al menos 15 cm.

**ADVERTENCIA:** Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización, pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación climatología, etc...). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Lenacelga

Poivo mojabie (WP)

HERBICIDA