



Effi, nuestro embajador en un mundo donde los perros están protegidos.

**EFFITIX**<sup>®</sup>  
SOLUCIÓN SPOT-ON

Con fipronilo y permetrina

**4** parásitos **X** **4** semanas

Flebotomos



Garrapatas



Pulgas



Mosquitos



**¿Por qué hacerlo difícil  
si puedes hacerlo Effitix<sup>®</sup>?**




**VIRBAC  
EXPERTO EN  
LEISHMANIOSIS**

## 4 ectoparásitos principales. 4 amenazas para la salud del perro

Ejemplos de enfermedades relacionadas con los principales parásitos externos del perro.




**FLEBOTOMOS**  
Leishmaniosis



**GARRAPATAS**  
Ehrliquiosis  
Babesiosis  
Borreliosis




**PULGAS**  
Pulicosis,  
DAPP  
Vectores de  
*Dipylidium caninum*



**MOSQUITOS**  
Dirofilariosis

## Effitix, una nueva asociación


Combina el poder de fipronilo con el de permetrina, dos moléculas con doble acción acaricida e insecticida.



**FIPRONILO**

Fenilpirazoles

Acaricida • Insecticida



**PERMETRINA**

Piretroides

Acaricida • Insecticida • Repelente

### INSECTICIDA

Pulgas

*Ctenocephalides felis*

### ACARICIDA

Garrapatas

*Ixodes ricinus*, *Dermacentor*

*reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*

### REPELENTE

Flebotomos

*Phlebotomus perniciosus*

### REPELENTE

Mosquitos

*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*

Para ser administrado frente a infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando también es necesaria la actividad repelente (anti-alimentación) frente a flebotomos y/o mosquitos.

Eficaz 4 semanas sobre 4 parásitos


Flebotomos



Garrapatas



Pulgas



Mosquitos



## Gama completa para todos los perros (A partir de 1,5 kg. Para perros con un peso de más de 60 kg, consultar el prospecto)

### Cajas de 24 pipetas



Perros muy pequeños (1,5-4 kg)  
Effitix 26,8 mg/240 mg



Perros pequeños (4-10 kg)  
Effitix 67 mg/600 mg



Perros medianos (10-20 kg)  
Effitix 134 mg/1.200 mg



Perros grandes (20-40 kg)  
Effitix 268 mg/2.400 mg



Perros muy grandes (40-60 kg)  
Effitix 402 mg/3.600 mg

### Flexipack de 24 pipetas

- Formato adaptado para una prescripción personalizada.




### Pipeta de fácil control

- Apertura fácil.
- Aplicación precisa.
- Control de la dosis administrada.



### Aplicación en 2 o 4 puntos



## Gran impacto en tu clínica


Disponibles a través del Gerente de Zona.



Stopper



Display portafolletos



Tótem



Expositor



Aéreo

## ¿Por qué hacerlo difícil si puedes hacerlo Effitix®?

### 4 PARÁSITOS, 4 SEMANAS

Una aplicación al mes protege eficazmente contra los 4 parásitos

### PROTECCIÓN CONTRA EL FLEBOTOMO

4 semanas de actividad repelente contra flebotomos

### PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE TAMAÑOS

Presentaciones disponibles en 4 y 24 pipetas

**EFFITIX® solución spot on para perros** **Composición** Fipronilo: 61 mg/ml. Permetrina: 545 mg/ml. **Indicaciones** Infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando también es necesaria la actividad repelente frente a flebotomos y/o mosquitos. **Posología** 1 pipeta de la presentación correspondiente según peso del animal. Para perros > 60 kg usar la combinación apropiada de pipetas. La dosis mínima es de 6,7 mg fipronilo/kg pv y 60 mg de permetrina/kg pv. En perros < 20 kg aplicar en dos puntos. En > de 20 kg aplicar en 2-4 puntos. **Contraindicaciones** Hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes. No usar en gatos ni conejos. No usar en animales enfermos o convalecientes, perros de menos de 12 semanas o de 1,5 kg. **Reacciones adversas** Reacciones cutáneas en el lugar de administración (prurito, eritema) y prurito general. Hiperactividad. Vómitos. En caso de lamedura, hipersalivación transitoria. **Precauciones** Mantener alejado de los niños. Conservar < 30 °C en embalaje original. Baños frecuentes podrían afectar la eficacia. Tratar a todos los animales del hogar. Evitar contacto con ojos y boca y el lamido. Extremadamente tóxico para los gatos: mantener los perros tratados alejados hasta que se seque la zona y en caso de exposición accidental, lavar al gato y acudir al veterinario. **Precauciones para las personas** Puede causar neurotoxicidad e irritación de ojos, piel o mucosas por contacto y puede ser nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona y consulte con un médico. Lavar las manos después del uso. No comer, beber o fumar. Las personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el contacto durante 12 h. Puede afectar adversamente a los organismos acuáticos: los perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes. **Gestación y lactación** Evaluar beneficio riesgo. Uso veterinario. **Presentaciones** Cajas de 4 o 24 pipetas. Virbac, S.A. **Nº de Registro** Effitix 26,8 mg/240 mg solución spot on para perros muy pequeños (1,5-4 kg): 3098 ESP. Effitix 67 mg/600 mg solución spot on para perros pequeños (4-10 kg): 3099 ESP. Effitix 134 mg/1.200 mg solución spot on para perros medianos (10-20 kg): 3100 ESP. Effitix 268 mg/2.400 mg solución spot on para perros grandes (20-40 kg): 3101 ESP. Effitix 402 mg/3.600 mg solución spot on para perros muy grandes (40-60 kg): 3102 ESP.





## DIAGNÓSTICO



El test rápido de leishmaniosis más fiable para el screening previo a la vacunación

## PREVENCIÓN



Actividad repelente frente a flebotomos

## VACUNACIÓN




Inmunización activa de perros negativos a Leishmania a partir de los 6 meses

## TRATAMIENTO



Tratamiento oral de la leishmaniosis canina








## Acción repelente 4 semanas

Eficacia para prevenir la alimentación\*  
en flebotomos (*P. perniciosus*)<sup>1</sup>

### ACCIÓN ANTI-ALIMENTACIÓN CONTRA FLEBOTOMOS

\* Determinada a partir del recuento de hembras  
alimentadas (vivas o muertas) tras 1-1,5 h de  
exposición en perros



Flebotomos  
80 hembras



Perros 6



Tratamiento  
el día 0 (D0)



recomienda la prevención contra picaduras de flebotomos mediante la aplicación de repelentes/insecticidas y con vacunas contra la leishmaniosis canina para controlar la enfermedad<sup>2</sup>

1. Dossier AMM - Estudio F-104.140000-60014 2. ESCCAP (2011) Guía 4: lucha comparada de agentes patógenos transmitidos por vectores en perros y gatos


## Acción acaricida 4 semanas

Eficacia frente a garrapatas sobre el terreno<sup>1</sup>

### EFICACIA ACARICIDA PERSISTENTE EN GARRPATAS

*Dermacentor reticulatus*  
*Ixodes ricinus*  
*Rhipicephalus sanguineus*

Effitix reduce el riesgo  
de babesiosis canina<sup>2</sup>



Garrapatas  
infestación natural



Perros 123



Tratamiento  
el día 0 (D0)


1. Dossier AMM - Estudio F-104.140000-60007 2. SPC de EFFITIX® (sumario de características del producto, propiedades farmacodinámicas)

## Acción insecticida 4 semanas

Eficacia adulticida contra las pulgas (*Ctenocephalides felis*) transcurridas 24 h del postratamiento y posinfestación<sup>1</sup>

EFICACIA EN INFESTACIONES EXISTENTES  
Y EN LA PREVENCIÓN DE NUEVAS  
INFESTACIONES

Puede utilizarse en el marco de una estrategia  
de tratamiento contra la DAPP



Pulgas  
100



Perros 8



Tratamiento  
el día 0 (D0)

1. Dossier AMM - Estudio F-104.140000-60019




## Acción repelente 4 semanas

Efecto anti-alimentación\* en *A. aegypti* y *C. pipiens*<sup>1</sup>

### ACCIÓN ANTI-ALIMENTACIÓN CONTRA MOSQUITOS

Los mosquitos son los vectores potenciales de *Dirofilaria immitis* (agente de la dirofilariosis cardiopulmonar) y de *Dirofilaria repens* (agente de la dirofilariosis cutánea)

\* Determinada a partir del recuento de hembras alimentadas (vivas o muertas) tras 1-1,5 h de exposición en perros



Mosquitos  
75 a 80 hembras



Perros 6+6



Tratamiento  
el día 0 (D0)

1. Dossier AMM - Estudios F-104.140000-60022 y F-104.140000-60023



**EFFITIX® solución spot on para perros** **Composición** Fipronilo: 61 mg/ml. Permetrina: 545 mg/ml. **Indicaciones** Infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando también es necesaria la actividad repelente frente a flebotomos y/o mosquitos. **Posología** 1 pipeta de la presentación correspondiente según peso del animal. Para perros > 60 kg usar la combinación apropiada de pipetas. La dosis mínima es de 6,7 mg fipronilo/kg pv y 60 mg de permetrina/kg pv. En perros < 20 kg aplicar en dos puntos. En > de 20 kg aplicar en 2-4 puntos. **Contraindicaciones** Hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes. No usar en gatos ni conejos. No usar en animales enfermos o convalecientes, perros de menos de 12 semanas o de 1,5 kg. **Reacciones adversas** Reacciones cutáneas en el lugar de administración (prurito, eritema) y prurito general. Hiperactividad. Vómitos. En caso de lamedura, hipersalivación transitoria. **Precauciones** Mantener alejado de los niños. Conservar < 30 °C en embalaje original. Baños frecuentes podrían afectar la eficacia. Tratar a todos los animales del hogar. Evitar contacto con ojos y boca y el lamido. Extremadamente tóxico para los gatos: mantener los perros tratados alejados hasta que se seque la zona y en caso de exposición accidental, lavar al gato y acudir al veterinario. **Precauciones para las personas** Puede causar neurotoxicidad e irritación de ojos, piel o mucosas por contacto y puede ser nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona y consulte con un médico. Lavar las manos después del uso. No comer, beber o fumar. Las personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el contacto durante 12 h. Puede afectar adversamente a los organismos acuáticos: los perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes. **Gestación y lactación** Evaluar beneficio riesgo. Uso veterinario. **Presentaciones** Cajas de 4 o 24 pipetas. Virbac, S.A. **Nº de Registro** Effitix 26,8 mg/240 mg solución spot on para perros muy pequeños (1,5-4 kg): 3098 ESP. Effitix 67 mg/600 mg solución spot on para perros pequeños (4-10 kg): 3099 ESP. Effitix 134 mg/1.200 mg solución spot on para perros medianos (10-20 kg): 3100 ESP. Effitix 268 mg/2.400 mg solución spot on para perros grandes (20-40 kg): 3101 ESP. Effitix 402 mg/3.600 mg solución spot on para perros muy grandes (40-60 kg): 3102 ESP.



previo a la vacunación

frente a flebotomos

Leishmania a partir de los



**CANILEISH® liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para perros** **Composición** Proteínas Secretadas y Excretadas (PSE) por *Leishmania infantum* mínimo 100 µg. Extracto purificado de *Quillaja saponaria* (QA-21): 60 µg. **Indicaciones** Inmunización activa de perros negativos a *Leishmania* a partir de los 6 meses, para reducir el riesgo de desarrollar una infección activa y la enfermedad clínica después del contacto con *Leishmania infantum*. **Posología y modo de empleo** Una dosis/perro vía subcutánea. Se recomienda realizar un test de diagnóstico rápido de *Leishmania* antes de la vacunación. **Primovacunación:** 1ª dosis a los 6 meses, 2ª dosis 3 semanas más tarde, y 3ª dosis 3 semanas después. **Inicio de la inmunidad:** 4 semanas después de la Primovacunación. Revacunación anual. **Presentación** Caja con 15 dosis. **Contraindicaciones** Hipersensibilidad a la sustancia activa, al adyuvante o a algún excipiente. **Observaciones** Después de vacunar pueden aparecer anticuerpos transitorios frente a *Leishmania*. Pueden aparecer reacciones locales como inflamación, nódulo, dolor a la palpación o eritema que se resuelven en 2 a 15 días y otros signos como hipertermia, apatía y trastornos digestivos durante 1 a 6 días. En muy raros casos se han reportado reacciones más severas (necrosis en el punto de inyección, vasculitis). En caso de anafilaxia administrar tratamiento sintomático. Vacunar solo animales sanos y desparasitados. La vacunación no excluye otras medidas para reducir la exposición a flebotomos. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico. No ha quedado demostrada la seguridad durante la gestación ni la lactancia. Los datos de eficacia han demostrado que los perros vacunados tienen 3,6 veces menos riesgo de desarrollar una infección activa y 4 veces menos riesgo de desarrollar la enfermedad clínica que los perros no vacunados. Mantener refrigerado (2°C - 8°C). Proteger de la luz. Con prescripción veterinaria. EU/2/11/121/001-009.





**MILTEFORAN 20 mg/ml solución oral para perros** **Composición** Miltefosina 20 mg/ml. Hidroxipropilcelulosa, Propilenglicol, Agua purificada. **Indicaciones y especies de destino** Control de la leishmaniosis canina. **Contraindicaciones** Hipersensibilidad al principio o a alguno de los excipientes. Gestación, lactancia y animales en reproducción. **Reacciones adversas** Durante los estudios clínicos, fueron muy comunes los vómitos moderados y transitorios (el 16% de los perros tratados), así como comunes los episodios de diarrea (el 12% de los perros tratados). Estos efectos se produjeron como media en los 5 a 7 días después de iniciar el tratamiento y durante un periodo de 1 a 2 días en la mayoría de los casos, sin embargo pueden prolongarse, hasta más de 7 días en algunos animales. No afectaron a la eficacia del producto y por consiguiente no fue necesario interrumpir el tratamiento o cambiar el régimen de dosis. Fueron reversibles al final de tratamiento y todos los perros se recuperaron sin terapia específica. **Posología** Administrar 2 mg/kg de peso vivo, vertido sobre el alimento una vez al día durante 28 días por vía oral (lo que corresponde a 1 ml de la solución oral por 10 kg de peso vivo al día). **Recomendación para una correcta administración** Dado que el parásito también se localiza en los tejidos profundos (médula ósea, nódulos linfáticos, bazo, hígado), es esencial respetar la duración del tratamiento (28 días) para garantizar la eficacia del producto. Se debe determinar con exactitud el peso del perro, antes y durante el tratamiento. **Precauciones especiales de conservación** No requiere. Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. Período de validez después de abierto: 1 mes. **Advertencias especiales** Evitar infradosificaciones para disminuir el riesgo de resistencias. Determinar con exactitud el peso del perro. Se recomienda administrar en el pienso del animal para reducir los efectos secundarios digestivos. En caso de aparición de efectos secundarios informar inmediatamente al veterinario. Se puede combinar con un agente antiemético con el fin de reducir los efectos adversos. En perros con insuficiencias hepática y cardíaca grave el veterinario deberá valorar el beneficio/riesgo. Si sospecha que su perra está en gestación antes de usar el medicamento, consulte con su veterinario. Precauciones que deberá adoptar la persona que administre el medicamento: En caso de ingestión accidental o derrame sobre la piel consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el prospecto. Las personas con hipersensibilidad conocida a la miltefosina deberán evitar todo contacto con el medicamento veterinario o con cualquier tipo de excreción de los animales (elementos fecales, orina, vómitos, saliva etc.) y deberán administrar el producto con precaución. Puede provocar irritaciones de la piel y de los ojos así como sensibilización: en caso de contacto enjuagar inmediatamente con abundante agua y consultar con un médico. Manipular con guantes y gafas. No debe ser administrado por mujeres embarazadas, mujeres con intención de quedarse embarazadas y aquellas que no sepan si están embarazadas. No permitir que los perros recién tratados laman a personas inmediatamente después de haber tomado la medicación. No comer ni beber o fumar mientras se administre el producto. No agitar el frasco para evitar la formación de espuma. Uso durante la gestación o la lactancia: No utilizar el medicamento durante la gestación, la lactancia o en animales reproductores. Los estudios de laboratorio efectuados en ratas y conejos han evidenciado efectos teratogénicos (ratas), tóxicos para el feto y tóxicos para la madre. **Presentaciones** Frasco con 30, 60 ó 90 ml. Sobredosificación: Un estudio de sobredosis (hasta dos veces la dosis recomendada durante 28 días) mostró efectos indeseables tales como vómitos incontrolables. **Precauciones al eliminar el medicamento o sus residuos** Deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. **Con prescripción veterinaria.** **Nº de registro** 1761 ESP. VIRBAC S.A - 1ère Avenue – 2065 m – I.I.D. – 06516 CARROS - FRANCIA

