

Robitussin®



- **ROBITUSSIN DM:** Dextrometorfano. **Calma la tos seca e irritativa.** C.N. 828160
- **ROBITUSSIN Expectorante:** Guaifenesina. Indicado en tos productiva. **Facilita la expectoración.** C.N. 826602
- **ROBITUSSIN PE:** Guaifenesina/ Pseudoefedrina. **Indicado en tos productiva con congestión nasal.** C.N. 826636

No contienen azúcar. Envases de 200 ml.

COMPOSICIÓN

ROBITUSSIN, Expectorante (por 10 ml): Guaifenesina (D.C.I.), 200 mg. Excipientes: Benzoato sódico, Glicerol, Etanol, y otros c.s.p. 10 ml. **ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos (por 5 ml):** Dextrometorfano BrH (D.C.I.), 10 mg. Excipientes: Etanol, Glicerol, Benzoato sódico, y otros c.s.p. 5 ml. **ROBITUSSIN PE (por 10 ml):** Guaifenesina (D.C.I.), 200 mg; Pseudoefedrina (D.C.I.) HCl, 60 mg. Excipientes: Etanol, Glicerol, Benzoato sódico, Solución sorbitol y otros c.s.p. 10 ml.

INDICACIONES

ROBITUSSIN, Expectorante: Expectorante para el tratamiento de la tos. **ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos:** Antitusivo, tratamiento sintomático de todas las formas improductivas de tos (tos irritativa, tos nerviosa). **ROBITUSSIN PE:** Tratamiento sintomático de la tos con congestión, así como de la obstrucción e hipersecreción nasal.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Empleando el vaso dosificador, las dosis a emplear son las siguientes: **ROBITUSSIN, Expectorante y ROBITUSSIN PE:** Adultos y jóvenes mayores de 12 años: 10 ml, 3-4 veces al día; Niños de 6 a 12 años: 5 ml, 3-4 veces al día; Niños de 3 a 6 años: 2,5 ml, 3-4 veces al día; Niños menores de 3 años: consulte a su médico. **ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos:** Adultos: 5 – 10 ml, cada 4 o 6 horas. Máximo 60 ml al día.

CONTRAINDICACIONES

ROBITUSSIN, Expectorante: Hipersensibilidad al gliceril guayacolato (guaifenesina). **ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos:** Hipersensibilidad al dextrometorfano. Insuficiencia respiratoria. Tos asmática. **ROBITUSSIN PE:** Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. No utilizar en personas que estén sometidas a tratamiento con inhibidores de las amino oxidasas o los hayan recibido en las dos semanas anteriores. Utilícese con precaución en personas que tengan enfermedades cardíacas, hipertensión ó diabetes.

EFFECTOS SECUNDARIOS

ROBITUSSIN, Expectorante y ROBITUSSIN PE: Ocasionalmente se pueden presentar náuseas y raramente vómitos. **ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos:** Raramente puede aparecer somnolencia o molestias gastrointestinales. En este caso es aconsejable reducir la posología. El

consumo simultáneo de alcohol durante el tratamiento puede acentuar la aparición de efectos secundarios. No ingerir bebidas alcohólicas durante el mismo.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

Llamar al Servicio de Información Toxicológica (teléfono 91-5620420), indicando el nombre y la cantidad de medicamento tomado. **ROBITUSSIN, Expectorante**: En caso de ingestión masiva accidental se recurrirá a tratamiento sintomático y lavado gástrico. **ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos**: Los signos de sobredosificación se manifiestan por: confusión, excitabilidad, inquietud, nerviosismo e irritabilidad. La ingestión accidental de dosis muy altas puede producir en los niños un estado de sopor o alteraciones en la forma de andar. Estos efectos desaparecen mediante la inducción del vómito y lavado gástrico. En caso de depresión respiratoria, administrar naloxona y asistencia respiratoria. En caso de convulsiones, administrar benzodiazepina I.V. o rectal, en función de la edad. **ROBITUSSIN PE**: En caso de ingestión de dosis excesivas puede aparecer somnolencia, letargo, confusión, caída de tensión y flacidez muscular. En caso de ingestión masiva accidental se recurrirá a tratamiento sintomático y lavado gástrico

ADVERTENCIAS

No administrar a niños menores de 2 años, salvo indicación del médico. Consulte a su médico si la tos persiste más de una semana, es recurrente ó va acompañada de fiebre alta, dolor de cabeza persistente o erupción de la piel. **ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos**: No utilizar este medicamento en caso de tos persistente o crónica, como la debida al tabaco, asma o enfisema, o cuando la tos va acompañada de abundantes secreciones. **ROBITUSSIN PE**: Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control de dopaje como positivo. Las mujeres que estén en periodo de lactancia no deberían usar este medicamento sin consultar al médico.

Importante para la mujer:

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por el médico”.

Advertencias sobre excipientes

Este medicamento, por contener glicerol como excipiente, puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. Este medicamento contiene etanol, lo que puede ser causa de riesgo en mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros medicamentos. **ROBITUSSIN, Expectorante y ROBITUSSIN DM Antitusivo Adultos**: Por contener benzoato sódico como excipiente puede irritar ligeramente los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos. **ROBITUSSIN PE**: Este medicamento contiene 2908 mg de sorbitol por 10 ml. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

PRECAUCIONES

ROBITUSSIN PE: Puede producir una ligera somnolencia ó una ligera excitación. Se observará precaución en la conducción de vehículos y/o en el manejo de maquinaria peligrosa. El uso simultáneo del alcohol con esta medicación puede acentuar la aparición de efectos secundarios.

PRESENTACIÓN

Envase con 200 ml (se incluye vaso dosificador graduado hasta 30 ml), Sin receta médica. Especialidad Farmacéutica Publicitaria.

San Sebastián de los Reyes (Madrid)