

FLAMADOL® Gel

Diclofenaco

ANTIINFLAMATORIO-ANTIRREUMATICO-
ANALGESICO

FORMULA

Cada 100 g contiene:
Diclofenaco dietilamina.....1,16 g
(Equivalente a 1 g de diclofenaco sódico)
Excipientes..... c.s.

PROPIEDADES

FLAMADOL® es un antiinflamatorio no esteroideo sintético, derivado del ácido arilacético, con importantes propiedades antiinflamatorias, antirreumáticas y analgésicas, cuya formulación en gel, hace que éste se absorba muy rápido y totalmente, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, las cuales desempeñan un papel importante en el proceso de la inflamación.

INDICACIONES

Por su propiedad antiinflamatoria y analgésica, está indicada especialmente en los procesos reumáticos crónicos, sobre todo en los de tipo inflamatorio como la artritis reumatoidea, en las que no solamente disminuyen el dolor sino también la tumefacción y la rigidez articular.

Es capaz de aliviar el dolor de tipo somático y en especial los debidos a procesos reumáticos.

Está indicado para el tratamiento local de:

Inflamación traumática de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones a causa de esguinces, luxaciones y contusiones.
Formas localizadas de reumatismo de tejidos blandos, como tendosinovitis, síndrome de hombro-mano y bursitis.
Afecciones reumáticas localizadas, como osteoartritis de las articulaciones periféricas y de la columna vertebral, periartropatía.



DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION

Dosis:

Adultos y niños mayores de 12 años: aplíquese una cantidad suficiente de flamadol® en la parte adolorida dando un leve masaje hasta que se absorba totalmente. Después de su aplicación, deben pasar unos minutos antes de cubrir o vendar la zona afectada. El tratamiento debe repetirse de 3 a 4 veces al día. Ancianos: puede utilizarse la misma posología que para los adultos.

Duración del tratamiento: De acuerdo a respuesta.

Siga correctamente el modo de empleo. No exceda la dosis indicada, ni utilice por más de dos semanas en casos de golpes en músculos o articulaciones y tendinitis; por más de tres semanas en caso de dolor artrítico, a menos que sea indicado por el médico.

Si los síntomas persisten o empeoran, después de 7 días, consulte a su médico.

Vía de administración: TOPICA

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Embarazo, lactancia. No existen estudios que demuestren si algunos de los componentes son excretados en cantidades significativas por la leche materna, por lo que es importante requerir la opinión médica.

EFFECTOS ADVERSOS

No se producen reacciones adversas a las dosis recomendadas.

Cuando se aplica localmente el diclofenaco dietilamonio en zonas cutáneas relativamente amplias y durante un periodo prolongado, no se puede descartar la posibilidad de efectos secundarios sistémicos. En estos casos se debe consultar al médico inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES

No debe ser utilizado en niños menores de 12 años de edad.

Hipersensibilidad al diclofenaco, ácido acetilsalicílico y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos

No aplicar sobre heridas cutáneas o abiertas. Evitar que entre en contacto con los ojos y/o mucosas. Embarazo.

No debe administrarse por vía oral.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente no mayor a 30°C.

PRESENTACIONES

FLAMADOL® gel, caja conteniendo un tubo x 20 y 50 g

Fabricado por:
GRUPO ALCOS S.A.
División:
LABOFARMA
www.grupoalcos.com
info@grupoalcos.com

Regente Farmacéutico:
Dr. Cosme Liendo R.
Autorizado por el Ministerio de Salud
Registro Sanitario: NN-16128/2008

La Paz - Bolivia