

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

Duett®-M

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DUETT®-M, combina la acción penetrante y de choque del Cimoxanilo, con la prolongada acción residual por contacto del Mancozeb, logrando una acción fungicida en superficie en las hojas y en profundidad dentro de los tejidos. Se caracteriza por ejercer acción tanto preventiva como erradicante inhibiendo diversos procesos metabólicos en las células del hongo consiguiendo una óptima protección.

Nº DE REGISTRO:

22.487.

COMPOSICIÓN:

Cimoxanilo 4% P/P + Mancozeb 40% (SC) P/V.

FORMULACIÓN:

Asociación de fungicidas, en forma de polvo mojable (WP).

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 y 5 kg.

MODO DE ACCIÓN

Información técnica

MATERIAS ACTIVAS	VENTAJAS
MANCOZEB, se caracteriza por su amplio campo de acción y buena persistencia, unos 15 días, actuando por contacto. Resulta efectivo en el control preventivo de enfermedades foliares producidas por hongos endoparásitos. CIMOXANILO es un fungicida penetrante y con acción traslaminar, de contacto, preventivo y curativo de postinfección y erradicante y con sistemía local. Es efectivo contra la mayoría de los hongos del orden Peronosporales. La asociación de estas materias activas controla los ataques de mildiu destruyendo el hongo en la superficie de las hojas en el momento de la germinación de las esporas. Además, el cimoxanilo gracias a su poder de penetración en los tejidos vegetales, puede destruir selectivamente el micelio del hongo parásito durante su periodo de incubación impidiendo que se originen lesiones o daños en el cultivo.	• Amplio campo de acción: prevención de enfermedades fúngicas en superficie de las hojas y en el interior de los tejidos vegetales. • Reducción al mínimo la posibilidad de aparición de razas resistentes. • Buena persistencia y resistencia al lavado por lluvia. • Gran adherencia y penetración en la planta. • Acción curativa: efecto stop, puede detener el desarrollo del hongo después de que éste haya penetrado en la planta incluso si llueve de forma moderada. Su formulación conjunta mejoran su acción sobre <i>Alternaria solani</i>, <i>Erysiphe (Uncinula) necator</i>, <i>Guignardia bidwellii</i>, <i>Phytophthora infestans</i>, <i>Plasmopara viticola</i>, <i>Pseudoperonospora cubensis</i> y <i>Septoria lycopersici</i>.

MODO DE EMPLEO

CULTIVO Y BENEFICIO	DOSIS	P.S.	L.M.R.s Cimoxanilo	L.M.R.s Mancozeb
Vid. Black-rot y Mildiu.	0,3%	15-21 (vid de vinificación)	0,1-0,5	1,5-2
Tomate. Alternaria, mildiu y septoria.		3	0,05	0,3
Patata. Alternaria y mildiu.		15	0,2	3
Cucurbitáceas. Mildiu.		15	0,2	5

P.S.: Plazo de seguridad • **N.P.:** No procede.

Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

CONSEJOS DE USO Y PRECAUCIONES

Aplicar en pulverización normal realizando una buena cobertura de las plantas. Consultar con el servicio técnico de **UPL Iberia** en caso de duda sobre mezclas.

Todos los productos que contienen cimoxanilo pueden utilizarse en cualquier momento, sin embargo, es aconsejable su aplicación antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad pues, de esta forma, actuarán como preventivos impidiendo la infección o, si se ha producido ésta, destruirán al patógeno actuando como curativos; a la vez, se reducirá al mínimo la posibilidad de aparición de razas resistentes si se alternan con otros fungicidas que posean diferente forma de acción. No se debe mezclar con productos alcalinos.

Almacenar evitando la humedad, y a temperaturas que no estén debajo de -15°C o más de +40°C.

Uso reservado a aplicadores y agricultores profesionales. Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Respetar las dosis, condiciones y precauciones de uso, leer la etiqueta del producto antes de usarlo. A la hora de realizar un tratamiento, tomar en cuenta las condiciones de su cultivo (tipo de suelo, presión de plaga o enfermedad, variedad, desarrollo vegetativo, estado del cultivo, resistencias) para optimizar el tratamiento. Para limitar la aparición de resistencias, alternar con otros fungicidas con distinto tipo de acción.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.