



## COLEGIO BASAURI IKASTETXEA

Basozelai, s/n – 48970 Basauri  
Tf. 94 449 20 38 Fx 94 426 09 29  
basauri\_sc@cospa.es

### PROTOCOLO ENFERMEDADES

La normativa de aplicación en el Colegio Basauri – Sdad. Coop. de Enseñanza, respecto a **enfermedades y medicamentos** cumpliendo las directrices de los departamentos de Sanidad y Educación es la siguiente:

#### 1. FAMILIAS:

- 1.1. En caso de *pertenecer* el/la alumno/a a un **sistema diferente** al de la Seguridad Social la familia deberá comunicárselo al/a la tutor/a.
- 1.2. En caso de que el/la alumno/a sufra algún tipo de **enfermedad crónica** o requiera **tratamiento** la familia deberá comunicarlo al Centro al realizar la matrícula.
- 1.1. Si el/la alumno/a es **alérgico/a** a un alimento la familia deberá comunicárselo al/a la tutor/a y presentar un certificado médico en caso de que el/la alumno/a se quede a comer en el comedor. Los padres facilitarán a los responsables del comedor un listado de productos “seguros”, marcas controladas por la asociación o productos que consuma habitualmente en casa sin problemas y a la vez un listado de productos “prohibidos”.
- 1.2. Los/las profesores/as no pueden suministrar **medicamentos de ningún tipo ni pomadas** a ningún alumno/a sin una autorización por escrito de los padres o tutores y la prescripción médica. Para ello la familia debe entregar al/a la tutor/a una fotocopia firmada de la autorización y la receta entregada por el médico en la que se ha prescrito el medicamento.
- 1.3. Las **heridas** podrán *ser curadas* solamente con suero fisiológico o con agua y jabón. Si son recientes deberán traerse tapadas de casa.
- 1.4. En caso de precisar traslado a un **centro hospitalario** se hará siempre en ambulancia o taxi. Nunca en coche particular.
- 1.5. Si se detecta fiebre, vómitos, descomposiciones,... en algún/alguna alumno/a se avisará a la familia lo antes posible para que venga a recogerlo/a.
- 1.6. **No se debe enviar al/a la niño/a al Colegio en caso de estar enfermo o si presenta afecciones de tipo contagioso.** El alumnado de Educación Infantil al escolarizarse entra en contacto con otros niños/as de su edad y con personas adultas, y al no tener aun desarrollado del todo su sistema inmunológico, aumenta el riesgo de contraer enfermedades. Cuando la criatura está enferma el Colegio no se encuentra en disposición de ofrecer las atenciones específicas que su situación demanda. Cada enfermedad requiere de unas atenciones y un procedimiento que hay que seguir. De este modo se cuida de la salud del/ de la niño/a enfermo/a y del resto de niños/as que conviven con él/ella.
- 1.7. Síntomas que más se repiten en la infancia:

Síntomas	Respuesta ante estos síntomas si se dan en...	
	Familia	Colegio
Fiebre Vómitos Descomposiciones	No enviar al/ a la niño/a al Colegio	Informar inmediatamente a la familia

#### ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN MÁS FRECUENTES EN EDAD ESCOLAR

ENFERMEDAD	COMUNICARLO AL COLEGIO	PERIODO SIN ACUDIR AL COLEGIO	ALTA DEL PEDIATRA
<b>Faringitis</b>	SI	Según criterio del pediatra	NO
<b>Laringitis</b>	SI	Según criterio del pediatra	NO
<b>Amigdalitis</b>	SI	Según criterio del pediatra	NO

<b>Varicela</b>	SI	7 días desde que salen las erupciones o tras curarse todas las postillas.	NO
<b>Escarlatina</b>	SI	48 horas después del comienzo del tratamiento.	NO
<b>Gastroenteritis</b>	SI	Hasta no tener descomposición.	NO
<b>Salmonelosis</b>	SI	Según criterio del pediatra	SI
<b>Parásitos intestinales</b>	NO	Ninguno.	NO
<b>Piojos</b>	SI	Hasta el siguiente día de iniciar el tratamiento.	NO
<b>Conjuntivitis</b>	SI	3 días después del tratamiento. Dependiendo de cómo evolucione se puede alargar.	SI
<b>Aftas</b>	SI	Según criterio del pediatra	SI
<b>Hepatitis A,B,C</b>	SI	Depende de cómo evolucione	SI
<b>Meningitis</b>	SI	Depende de cómo evolucione	SI
<b>Tuberculosis</b>	SI	Depende de cómo evolucione	SI
<b>Sarampión</b>	SI	4-6 días posteriores a las erupciones.	SI
<b>Rubéola</b>	SI	7 días posteriores a las erupciones.	SI
<b>Tina</b>	SI	7 días desde que aparecen los síntomas.	SI
<b>Sarna</b>	SI	Hasta terminar el tratamiento.	SI
<b>Tos ferina</b>	SI	5 días a partir del comienzo del tratamiento.	SI

## 2. PROFESORES/AS

- 2.1. Todo el profesorado tiene que tener conocimiento de los casos graves que existan en el centro.
- 2.2. Los documentos médicos junto con el permiso familiar deben estar archivados junto con el expediente del / de la alumno/a y a su vez en un lugar visible del aula para saber qué hacer en caso de intervención.
- 2.3. En ningún caso se puede dar a un niño alérgico un alimento sin el consentimiento de los padres. Si un niño rechaza un alimento, no debe obligarse nunca a que lo coma.
- 2.4. Si el/la alumno/a hace uso del servicio de comedor el/la encargado/a junto con el personal auxiliar deben tener conocimiento de los casos.
- 2.5. Para limpiar las heridas se utilizarán guantes.
- 2.6. Cuando el/la alumno/a se dé un golpe se le aplicará hielo cubierto con un pañuelo/bolsa.
- 2.7. Las manchas de sangre y vómitos deberán limpiarse con lejía diluida.
- 2.8. En caso de suceder una emergencia se avisará al 112 y al mismo tiempo a la familia.
- 2.9. Los medicamentos deberán ser traídos por los padres-madres o tutor-a y se guardarán en lugar seguro fuera del alcance de los/as niños/as.

Aprobado por el Consejo Escolar del Colegio Basauri – Sdad. Coop. de Enseñanza en la sesión N° 105 realizada el día 31 de marzo de 2009 a las 18:30 h. como punto 7 del Orden del día.

El Secretario

El Presidente

Fdo. Joseba Mollar

Fdo. Joseba Iñaki Ojanguren

## DIABETES

Valores óptimos: De 72 a 110 mg/dl en ayunas, Inferior a 180 mg/dl si se mide 1 ½ hora después de las comidas

<u>SITUACIONES</u>	<u>SÍNTOMAS</u>	<u>ACTUACIÓN</u>
<p><b><u>La hipoglucemia sin pérdida de conciencia:</u></b> Es una disminución del nivel de azúcar en la sangre por debajo de 60 mg/dL</p> <p><b>CAUSAS:</b> Retraso o insuficiencia en la toma de alimentos Dosis excesiva de insulina Ejercicio físico excesivo o imprevisto</p>	<p>Temblor                      Visión borrosa Debilidad                    Dolor de cabeza Sudor frío                    Palidez Irritabilidad                Falta de atención Necesidad imperiosa de comer</p> <p><b>Algunos niños pueden no manifestar estos síntomas, en cuyo caso se sospechará la hipoglucemia ante un Comportamiento anómalo.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dar 15 g de azúcar (3 terrones o 1 vaso de 150 ml zumo de frutas o bebida de tipo cola.</li> <li>2. Dejar el niño en reposo.</li> <li>3. Cuando los síntomas han cedido, puede ser aconsejable dar 2-3 galletas "maría" o biscottes o una fruta, especialmente si falta tiempo para la siguiente comida.</li> <li>4. Si persiste volver a dar azúcarillo y galletas.</li> </ol>
<p><b><u>La hipoglucemia grave</u></b></p>	<p>Disminución de la conciencia Convulsiones que pueden confundirse con una crisis epiléptica Pérdida total del conocimiento.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No dar nada por boca.</li> <li>2. Inyectar una ampolla de glucagón intramuscular o subcutáneo en cualquier parte del cuerpo (glúteos, piernas, brazos, abdomen...).</li> <li>3. Avisar al Servicio de Urgencias.</li> <li>4. Cuando se recupere dar azúcarillo o zumo y galletas (El glucagón debe mantenerse en la nevera vigilando la caducidad.)</li> </ol>
<p><b><u>La hiperglucemia:</u></b> Consiste en un aumento excesivo de los niveles de azúcar en sangre. Suele ser de progresión más lenta que la hipoglucemia</p>	<p>Sed intensa Cansancio Vómitos y/o dolor abdominal Necesidad de orinar con frecuencia</p>	<p>En caso de hiperglucemia efectuar mediciones de glucosa para determinar cuánta insulina hay que administrar (determinada por su endocrino)</p>

ALERGIAS ALIMENTARIAS						INTOLERANCIAS	
LECHE	HUEVO	FRUTOS SECOS	LEGUMBRES	PESCADO	LATEX	CELIACOS (GLUTEN)	LACTOSA (AZUCAR DE LA LECHE)
<p>Leche</p> <p><u>Derivados:</u></p> <p>Yogur</p> <p>Queso</p> <p>Mantequilla</p> <p><u>Pueden contener:</u></p> <p>Embutidos</p> <p>Salsas industriales</p>	<p>Huevo</p> <p><u>Derivados:</u></p> <p>Mahonesa</p> <p>All-i-oli</p> <p>Merengue</p> <p><u>Pueden contener:</u></p> <p>Dulces industriales</p>	<p>Almendras</p> <p>Avellanas</p> <p>Nueces</p> <p>Cacahuetes</p> <p>Piñones</p> <p>Pipas</p> <p>Castañas...</p> <p><u>Pueden contener:</u></p> <p>chocolates</p>	<p>Lentejas</p> <p>Garbanzos</p> <p>Judias</p> <p>Guisantes</p> <p>Soja</p> <p>Cacahuetes</p> <p><u>Pueden contener:</u></p> <p>Proteína vegetal</p>	<p>Pescado</p> <p><u>Derivados</u></p> <p><u>Pueden contener:</u></p> <p>Pegatinas</p> <p>Pegamentos</p>	<p><b>Por contacto, ingestión o inhalación</b></p> <p>Gomas</p> <p>Guantes</p> <p>Globos</p> <p>Chupetes,...</p> <p>NO hinchar o explotar globos cerca.</p> <p>Reacción cruzada con plátano, castaña, kiwi, aguacate...</p> <p>Pinturas de dedos, bolígrafos, rotuladores, gomas de borrar, material de logopedia y psicomotricidad, calculadoras, juguetes, Tiritas esparadrapo</p>	<p>Trigo, triticale, Cebada, Centeno</p> <p>Avena</p> <p><u>Derivados:</u></p> <p>Pan, pastas, sémolas, sopas, galletas, bollería y pastelería</p> <p>Rebozados y empanados.</p> <p>Barquillos y obleas de helados, turrrones, etc.</p> <p><u>Pueden contener:</u> Lácteos con chocolate, sabores o quesos.</p> <p>Conservas de legumbres, de frutas, con tomate, escabeche, salsa o tinta.</p> <p>Carnes enlatadas, embutidos, fiambres, gelatinas, salchichas, foie-gras, patés. Mayonesa comercial.</p> <p>- Bebidas: Malta, agua de cebada y cerveza.</p> <p>Cafés de máquina e instantáneos</p> <p>- Caramelos, dulces y chicles de regaliz</p> <p>- Artificiales: colorantes, azafrán.</p> <p>Levadura en polvo, postres, Almidón, amiláceos, espesantes, fécula, gluten, harina, proteína, proteína natural hidrolizada, proteína vegetal, Chocolates y cacao y sucedáneos.</p>	<p>Leche</p> <p><u>Derivados:</u> Margarina, lácteos sólidos</p> <p>Mantequilla, Caseína</p> <p>Suero, Helados, Requesón Queso</p> <p>Fórmulas para lactantes</p> <p><u>Pueden contener:</u></p> <p>Purés y sopas, cremas</p> <p>Fiambres</p> <p>Pasteles y frituras s.</p> <p>Huevos y sucedáneos (batidos, flanes, etc.</p> <p>Bollería (Donuts, galletas, pastas, ..).</p> <p>Precocinados.</p> <p>Cereales enriquecidos</p> <p>Aderezos de ensaladas y mayonesas</p> <p>Pasteles, tartas, bizcochos, helados, sorbetes, y yogures</p> <p>Bebidas a base de leche,</p> <p>Alimentos fritos con mantequilla o pasta para rebozar</p> <p>Grageas de sucedáneos de chocolate.</p> <p>Pan y pasteles</p> <p>Bebidas envasadas-batidos</p> <p>Galletas</p> <p>Medicamentos</p>

# El autoinyector de adrenalina

SÍNTOMAS	MODO DE EMPLEO
<p><b>Mareo, calambres abdominales, micción involuntaria, incapacidad para respirar, taquicardia, pulso débil, enrojecimiento generalizado</b></p> <p><b><u>sibilancias</u></b> (pitidos respiratorios)</p> <p><b><u>angioedema</u></b> (hinchazón de partes de su cuerpo que puede afectar a su laringe generando sensación de cuerpo extraño en la garganta, como si le apretasen el cuello, o dificultad para tragar) ,</p> <p><b><u>urticaria y prurito</u></b> generalizado (fijese bien si siente picor el cuero cabelludo, palmas de manos y plantas de pies, genitales... puesto que estos datos sugieren que se está iniciando una reacción grave y generalizada)</p> <p><b>vómitos, diarrea, síncope</b> (caída brusca al suelo con pérdida de conocimiento), <b>convulsiones, intensa ansiedad...</b></p>	<p>NO sustituye a la emergencia hospitalaria.</p> <p>El autoinyector de adrenalina se ha diseñado para que pueda ser empleado por personas no profesionales, Al tratarse de un dispositivo automático, la aguja y el líquido se expulsan de forma automática.</p>  <p><b>Sujete el autoinyector por la parte intermedia, nunca por los extremos.</b> · Es importante que <b>no ponga nunca</b> el pulgar, la mano o los dedos sobre el extremo negro.</p> <p>· No quite nunca la tapa gris de seguridad hasta que el producto inyectado.</p>  <p><b>jeringa con el puño fuertemente alrededor de la zona intermedia, lado de la tapa gris de</b></p> <p>· Con la otra mano <b>quite la tapa gris</b> de seguridad.</p> <p>· <b>El extremo negro apuntará siempre hacia la parte externa del muslo</b>, como se observa en la figura</p> <p><b>Clávelo con un golpe seco y enérgico en la parte externa del muslo, de manera que el autoinyector forme un ángulo recto con la pierna.</b></p>  <p>· Una vez que presione el autoinyector contra el muslo ha de oír o sentir funcionar el mecanismo (<b>escuchará un clic</b>).</p> <p><b>Tiene que mantener el autoinyector en esta posición unos diez segundos.</b></p> <p>· Retire el autoinyector y masajee suavemente la zona de inyección durante unos diez segundos.</p> <p>· Ahora ha de acudir a su centro médico más próximo.</p>

## OBSERVACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE ADRENALINA

La inyección accidental en las manos o en los pies puede provocar la pérdida de riego sanguíneo de la zona afectada, por lo que es importante que haga una manipulación extremadamente cautelosa cuando requiera su uso. En el caso de que esto ocurra acuda al servicio de urgencias más próximo.

La solución de adrenalina contiene una sustancia denominada **metabisulfito sódico**, que en personas sensibles puede causar reacciones de tipo alérgico, leves, moderadas e incluso graves. Sin embargo las alternativas al uso de la adrenalina para las situaciones en las que se pauta pueden no ser satisfactorias. Por ello y a pesar de la presencia de este producto no debe dudar a la hora de emplearlo en las situaciones de riesgo vital antes referidas.

El empleo de la adrenalina puede producir **efectos adversos** que pueden consistir en:

- Nerviosismo, ansiedad.
- Temblor, mareos, dolor de cabeza.
- Palpitaciones, taquicardia, arritmias cardíacas.
- Palidez.
- Sudoración.
- Debilidad.
- Náuseas y vómitos.
- Dificultad para respirar.

En caso de presentar alguno de estos efectos adversos es preciso que busque atención médica de forma inmediata.

Es importante que realice un **examen periódico** del contenido del autoinyector a través de la zona transparente de la unidad, reemplazando la jeringa si la solución se ha deteriorado.

Puede aparecer una pequeña burbuja en la jeringa que no afecta ni al uso ni a la eficacia del producto.

En el caso de que la solución cambie de color o exista un precipitado en ella ha de desecharse siempre y sustituirla por otra.

Tenga en cuenta que el periodo de validez del autoinyector comercializado en la actualidad, **adreject® 0.3 adultos, 0.15 niños** es de 24 meses desde la fecha de fabricación.

La adrenalina es sensible a la luz por lo que el autoinyector debe conservarse en el tubo que se facilita, protegido de la luz y a temperatura ambiente, por lo tanto: no refrigerar, no congelar y no someterlo a temperaturas mayores de 25 grados.

El dispositivo de inyección **adreject® no contiene latex**.

No emplee nunca el autoinyector después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

LISTADO DE GOLOSINAS Y TXUTXES APTAS PARA  
CELIACOS+ALÉRGICOS AL HUEVO

1) BOLSAS:

- a) Lays al punto de sal
- b) Matutano – Ruffles onduladas ( sin sabores)
- c) Cheetos pandilla
- d) Aspitos
- e) Gusanitos ASPIL-JOJITOS
- f) Gusanitos RUFINOS

2) CHUPA-CHUPS

- a) Marca Chupa-chups sabores tradicionales (limón, fresa, naranja) . Ningún otro sabor o tipo. No los cremosos.
- b) Marca Vidal (Pom-Pito) todos los sabores.

3) PALOTES:

- a) Marca PALOTES sabor fresa
- b) Marca VIDAL sabor fresa

4) CAMELOS:

- a) Marca DULCIORA: Gummis ( gominolas con azúcar envueltas individualmente)

## ALERGIAS ALIMENTARIAS

Tener en cuenta los ingredientes con que están hechos algunos materiales escolares ya que la mayoría contienen látex y otros alérgenos, como por ejemplo plastilinas, pinturas, barnices, etc.  
Es muy importante concienciar a los alumnos que no deben ofrecer ningún tipo de alimento que pueda ser perjudicial y explicarles el por qué.  
Si un niño rechaza un alimento nunca se debe insistir en que lo tome, aunque el educador esté seguro que pueda comerlo.  
También debe enseñarse al niño/a afectado/a a no aceptar ningún alimento ofrecido por otra persona.  
En las excursiones y salidas hay que tener en cuenta el lugar escogido.

### Cómo actuar

Cutáneos  
Urticaria  
Angioedema  
Dermatitis  
Digestivos:  
Vómitos  
Diarreas  
Aversión alimentaria

Primeros síntomas;  
urticaria, picores, edema.



**Antihistamínicos**

Ante una reacción de carácter leve, (síntomas cutáneos o gastrointestinales), debe **llamar a los padres inmediatamente, para que tomen las medidas oportunas:** aconsejar el traslado a un centro médico o presentarse personalmente a recoger el niño. No dejar nunca al niño solo.

Respiratorios:  
Rinitis, tos, pitos,  
dificultad para respirar

Síntomas respiratorios;  
dificultad para respirar; tos, pitos,  
ahogo.

**Broncodilatadores**



Ante una reacción grave hay que **alertar inmediatamente a los servicios médicos.** Se llamará a los padres después. La prioridad es auxiliar primero a la persona alérgica.

Anafilácticos  
Desmayo  
Hipotensión  
Síncope



**ADRENALINA**

Si la reacción conlleva más gravedad y se trata de una reacción sistémica (anafiláctica), la primera medida será siempre **administrar adrenalina**, llamar a la ambulancia y finalmente avisar a la familia.

# Dossier Informativo de Material Escolar

## MAQUILLAJE

		Leche	Huevo	Soja	Pescado	Frutos secos	Gluten	Látex
<b>JOVI</b>	Maquillaje	no	no	Sí/leguminosas	no	no	no	no
<b>FABER CASTELL</b>	Tatto Marker (ref. nº 15-00-02)	no	no	no	no	no	no	no
<b>ALPINO FIESTA</b>	Tatto	no	no	no	no	no	no	no
	Face stick	no	no	no	no	no	no	no
	Alpino sets	no	no	no	no	no	no	no
	Alpino pasta barritas	no	no	no	no	no	no	no
<b>EBERHARDFABER</b>	Maquillaje	no	no	no	no	no	no	no

## GOMAS

		Leche	Huevo	Soja	Pescado	Frutos secos	Gluten	Látex
<b>PELIKAN</b>	Gomas	no	no	no	no	no	no	*Sí
	*Sí Las gomas de borrar contienen látex. En especial las que describimos como 'de caucho', que son la BR40, la BR80, la RW y la SP30.							
<b>JOVI</b>	Gomas	no	no	no	no	no	no	no
<b>FABER CASTELL</b>	Gomas Grip ref 18-71-01	no	no	no	no	no	no	no
<b>MILAN</b>	Gomas Milan	no	no	no	no	no	no	*
	*Sí contienen látex natural las referencias de las llamadas tinta y lápiz, por ejemplo: 460, 840, 8020, 8030, 740. El resto de referencias no contienen látex natural.							
<b>STAEDTLER</b>	Las gomas con referencias 525 B20 y 525 B30 no contienen ni PVC ni látex							

## PEGAMENTOS, COLAS Y ADHESIVOS

		Leche	Huevo	Soja	Pescado	Frutos secos	Gluten	Látex
<b>MILAN</b>	Glue Tape	no	no	no	no	no	no	no
	Precinto	no	no	no	no	no	no	no
	Cinta Adhesiva	no	no	no	no	no	no	no
<b>KORES</b>	Cintas adhesivas	no	no	no	no	no	no	no
	Post-it	no	no	no	no	no	no	no
	Pegamento liquido	no	no	no	no	no	no	no
	Pegamento solido	no	no	no	no	no	no	no
<b>CEYS</b>	Adhesivos y etiquetas	no	no	no	no	no	no	no
<b>INETA</b>	Etiquetas autoadhesivas	no	no	no	no	no	no	no
	Etiquetas removibles	no	no	no	no	no	no	no
	Gomets	no	no	no	no	no	no	no
<b>RAYT</b>	Su cola blanca no contiene látex natural. (Respuesta del 2007)							
<b>IMEDIO</b>	Salvo el pega tejido ningún otro de sus productos usa látex. (Respuesta del 2007)							
<b>APLI</b>	El único adhesivo que contiene látex es el empleado en las etiquetas removibles. Los cilindros de las máquinas de impresión contienen caucho. Durante el manipulado de los productos más delicados, por ejemplo, el papel fotográfico, el personal utiliza guantes de látex natural							
<b>HENKEL</b>	Pritt está exento de leche, huevo y látex natural. (Respuesta del 2007)							

## TIZAS

		Leche	Huevo	Soja	Pescado	Frutos secos	Gluten	Látex
<b>MILAN</b>	Tizas, 1037 y 1047	no	no	no	no	no	no	no
<b>FILA/GIOTTO</b>	Tizas Robercolor	Sí	no	no	no	no	no	no
<b>JOVI</b>	Tizas	Sí	no	no	no	no	no	no
<b>ALPINO</b>	Rotulador tiza líquida	no	no	no	no	no	no	no
	Rotulador para pizarra blanca	no	no	no	no	no	no	no
	Tizas (blancas y color)	no	no	no	no	no	no	no

## PINTURAS (EN TUBO, EN BOTELLA, TEMPERAS, ACUARELAS, DE DEDO, CRISTAL, TELA)

		Leche	Huevo	Soja	Pescado	Frutos secos	Gluten	Látex
<b>MILAN</b>	Temperas	no	no	no	no	no	no	no
	Acuarelas	no	no	no	no	no	no	no
	Pintura de dedos	no	no	no	no	no	no	no
<b>JOVI</b>	Tempera escolar **	no	no	no	no	no	no	no
	Tempera líquida	no	no	no	no	no	no	no
	Tempera metalizada	no	no	no	no	no	no	no
	Tempera Glitter	no	no	no	no	no	no	no
	Tempera fosforescente	no	no	no	no	no	no	no
	Acuarelas **	no	no	no	no	no	no	no
	Pintura Jovidecor	no	no	no	no	no	no	(sintético)
	Pintura dedos	no	no	no	no	no	no	no

\*\*= contienen derivados de la patata

<b>ALPINO</b>	Tempera	no						
	Pintura dedos	no						
	Pintura para cristal	no						
	Pintura para tela	no						

<b>MANLEY</b>	Tempera	no						
	Pintura dedos	no						

<b>FILA/ GIOTTO</b>	Pintura en botella*	no						
	Pintura dedos Be-bé*	no						
	Pintura en tubo*	no	no	Sí	no	no	no	no
	*= Contiene cereal							

<b>CRAYOLA</b>	Washable kid's paint	no	no	no	no	no	no	-*
	Color wonder	no	no	no	no	no	no	-*
	Squeezables	no	no	no	no	no	no	-*
	Pintura dedos	no	no	no	no	no	no	-*
	-*= puede estar manipulado por guantes de látex							

<b>TEXBA COLORS</b>	Fly flot	no						
	Pintura dedos	no						
	Acuarelas	no						

<b>PEBEO</b>	Setacolor, pintura para tela	no						
	Setaskrib, rotuladores para tela	no						
	Vitrea, pintura para vidrio	no						
	Drawing gum #033000 & 372000	no	no	no	no	no	no	Sí
	Latex #766331 & 766335	no	no	no	no	no	no	Sí

<b>TITAN</b>	Pinturas al oleo Goya	no	no	Sí/leguminosas	no	no	no	no
	Pinturas al óleo Extrafino	no	no	Sí/leguminosas	no	no	no	no
	Pinturas al óleo Bizancio	no	no	Sí/leguminosas	no	no	no	no
	Acrílicos extrafino	no	no	no	no	no	no	no
	Acualux	no	no	no	no	no	no	no
	Temperas **	no	no	no	no	no	no	no
	Gouache **	no	no	no	no	no	no	no

\*\*= contienen derivados de la patata

## LAPICES DE COLORES, CERAS, ROTULADORES, MARCADORES

		Leche	Huevo	Soja	Pescado	Frutos secos	Gluten	Látex
<b>MILAN</b>	Triangulares	no	no	no	no	no	no	no
	Lápices de colores	no	no	no	no	no	no	no
	Lápices de grafito	no	no	no	no	no	no	no
	Rotuladores punta fina	no	no	no	no	no	no	no
	Rotuladores punta cónica	no	no	no	no	no	no	no
	Rotuladores textil	no	no	no	no	no	no	no
	Marcadores fluor	no	no	no	no	no	no	no
	Cinta correctora	no	no	no	no	no	no	no

<b>JOVI</b>	Lápices de cera	no						
	Lápices de plásticos	no						
	Lápices de madera	no						
	Rotuladores	no						

<b>ALPINO</b>	Lápices de colores	no						
	Lápices de grafito	no						
	Rotuladores	no						
	Ceras Dacs	no						
	Alpino Baby ceras	no						
	Colores con purpurina	no						

<b>KORES</b>	Correctores líquidos y secos	no						
	Imprimibles	no						

<b>FILA/ GIOTTO</b>	Lápices de cera	no	no	Sí	no	no	no	no
	Lápices de cera Be-bé	no						
	Lápices de colores	no						
	Lápices de colores Be-bé	no						
	Tinta rotuladores	no						
	Tinta rotuladores Be-bé	no						

<b>CRAYOLA</b>	Lápices de cera (Crayons)	no	no	no	no	no	no	-*
	Lápices	no	no	no	no	no	no	-*
	Marcadores	no	no	no	no	no	no	-*
	-*= puede estar manipulado por guantes de látex							

<b>KORES</b>	Marcadores fluorescentes	no						
--------------	--------------------------	----	----	----	----	----	----	----

<b>MANLEY</b>	Colores a la cera	no						
---------------	-------------------	----	----	----	----	----	----	----

<b>FABER CASTELL</b>	Lapices colores Grip 2001, ref. 11-24-12, 11-24-06, 11-24-24	no						
	Marcadores Grip ref. 25-53-20	no						

<b>EDDING</b>	Marcadores	no						
---------------	------------	----	----	----	----	----	----	----

## PASTELINA Y PASTA MOLDEAR

		Leche	Huevo	Soja	Pescado	Frutos secos	Gluten	Látex
<b>JOVI</b>	Blandiver	no	no	no	no	no	Sí	no
	Plastilina	no	no	no	no	no	no	no
	Patcolor	no	no	no	no	no	no	no
	Pasta endurecible	no	no	no	no	no	no	no

<b>ALPINO</b>	Plastilina	no						
	Pasta para modelar	no						

<b>FILA/GIOTTO</b>	Giotto Patplume*	no						
	Das	no						
	Das Color*	no						
	Pasta para jugar Be-bé	no	no	no	no	no	Sí	no
	Didò*	no	no	no	no	no	Sí	no
*= contiene cereal								

<b>CRAYOLA</b>	Crayola dough	no	no	no	no	no	Sí	-*
	Modeling clay	no	no	no	no	no	Trazas	-*
	Air-dry clay	no	no	no	no	no	Trazas	-*
	Model Magic fusion	no	no	no	no	no	Trazas	-*
-*= puede estar manipulado por guantes de látex								

<b>CERAMICA COLLET</b>	Sio2 Escolar (arcilla de modelar en rojo y blanco)	no						
	Plus (arcilla autoendurecible 6 colores)	no						
	Color Plus (arcilla autoendurecible 12 colores)	no						

<b>EBERHARDFABER</b>	FIMO	no	no	no	no	no	no	no
	Efaplast	no	no	no	no	no	no	no
	Papel Maché	no	no	no	no	no	no	no
	Dough	no	no	no	no	no	(1)	no
	Clay (arcilla)	no	no	no	no	no	no	no
	Aquasoft clay	no	no	no	no	no	no	no
(1) las referencias 8134-01, 8134-02, 8134-03, 8134-04 y 8134-color contienen gluten								

## BARNIZ

		Leche	Huevo	Soja	Pescado	Frutos secos	Gluten	Látex
<b>JOVI</b>	Barniz	no	no	no	no	no	no	sintético
<b>MANLEY</b>	Barniz	no	no	no	no	no	no	no
<b>ALPINO</b>	Plastificador	no	no	no	no	no	no	no

## OTROS

<b>INETA</b>	Papelería (oficina y escolar), adhesivos en general	no						
--------------	---	----	----	----	----	----	----	----

## MATERIAL DEPORTIVO

<b>ELKSPORT</b>	Los artículos que empiezan por referencia 101, 106 y 103 están exentos de látex. <a href="http://www.elksport.com">www.elksport.com</a>							
<b>CORNILLEAU</b>	Las raquetas Tacteo (ping-pong) no contienen látex natural. <a href="http://www.cornilleau.com">www.cornilleau.com</a> (Respuesta del 2007)							