



Dow AgroSciences

DithaneTM F-MB

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

INGREDIENTE ACTIVO:

Mancozeb* 430 g/l
Complejo de Etilenbis Ditiocarbamato de Manganeso y Zinc de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro

*: El material grado técnico mancozeb tiene un contenido de etilentiourea (ETU) como impureza menor a 1g/kg (0.1% p/p)

Registro No.: 001-F22/NA

Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda., representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Diagonal 92 No. 17A - 42

Bogotá (57 1) 2196000

Soledad - Atlántico (57 5) 3759300



Dow AgroSciences

DISTRIBUIDO POR:

FarmAgro S.A.

Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7

Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263

Parque Industrial Vergeles

Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador



El compadre del agro

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

P.V.P.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

Dithane™ F-MB

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Dithane™ F-MB es un fungicida preventivo recomendado contra diferentes enfermedades foliares de las rosas.

INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS | P.C | P.R |
|--------------------------|---|---|------|----------|
| ROSAS (<i>Rosa</i> sp.) | Mildeu veloso (<i>Peronospora sparsa</i>) | 4.5 l/ha ó 3 cm ³ /litro de agua | N.A. | 12 horas |

P.C: Período de carencia

P.R: Período de reentrada

MODO DE EMPLEO:

Se recomienda realizar un buen cubrimiento del follaje del cultivo de rosa para obtener un buen control preventivo de veloso con el fungicida Dithane™ F-MB.

INSTRUCCIONES DE USO:

Dithane™ F-MB es recomendado para el control preventivo de Mildiu veloso (*Peronospora sparsa*) en el cultivo de rosas, además se puede utilizar para el manejo de pérdida de sensibilidad del patógeno a los fungicidas sistémicos. El producto puede ser usado solo ó en mezclas con otros fungicidas. Utilice un volumen mínimo de mezcla de 1500 litros de agua por hectárea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones se pueden realizar de manera preventiva o cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad (AFA 1%). Hacer de 12 a 15 aplicaciones al año.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Utilice aspersoras equipadas con boquillas que determinen una aspersion fina, que faciliten una completa cobertura de las plantas. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de 1500 litros por hectárea.





Dow AgroSciences

DithaneTM F-MB

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD:

Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



DithaneTM F-MB

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto
Consérvese en lugar cerrado
fuera del alcance de los niños

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO **Y APLICACIÓN:**

DAÑINO SI SE INGIERE. CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS.

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.

Durante la preparación y aplicación del producto usar overol, camisa de manga larga, mascarilla, gafas, guantes y botas de goma. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

Evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno.

Cuidado, evite el contacto, posible teratogénico.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de INGESTIÓN del producto provocar el vómito. INHALACIÓN apartar al accidentado de la zona de peligro y suministrarle aire fresco. Desabróchele la ropa en el área del pecho. En caso de dificultad respiratoria llamar al médico. Despojarse de la ropa contaminada. En caso de inconsciencia CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico.

NOTA AL MÉDICO: Se recomienda lavado gástrico.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS:
CITOX: 042 451022
Cisproquim: 1800 59 3005

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo.

Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original.

Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

ADVERTENCIA: NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

