

# M E T E O R I L

## Comprimidos masticables

Vía oral

### COMPOSICION CUANTITATIVA por comprimido:

Simeticona (D.C.I.) .....	50 mg
Aminoacetato de dihidroxialuminio .....	200 mg
Magnesio trisilicato .....	200 mg
Excipientes. Sacarina sódica. Manitol. Glicirrizato amónico. Aceite vegetal hidrogenado. Harina guar. Celulosa microcristalina. Talco. Macrogol 6000. Aroma de fresa.	

### PROPIEDADES

Simeticona (silicona antiespumante): favorece la eliminación del gas retenido en el estómago y en el intestino.

Aminoacetato de dihidroxialuminio y magnesio trisilicato: sustancias neutralizantes del exceso de ácido en el estómago.

### INDICACIONES

Tratamiento sintomático de molestias gastrointestinales asociadas a flatulencia (gases) e hiperacidez.

### MODO DE EMPLEO

Los comprimidos se deben masticar antes de tragar. A continuación tomar un vaso de agua. No tomar con leche.

### POSOLOGIA

**Adultos:** De 1 a 2 comprimidos masticados administrados de 20 minutos a 1 hora después de las comidas, y otra vez antes de acostarse.

**Niños:** Consultar al médico.

### CONTRAINDICACIONES

No utilizar este medicamento en pacientes con insuficiencia renal grave.

No tomar este medicamento si tiene algún síntoma de apendicitis, obstrucción o inflamación intestinal, como dolor abdominal, retortijones, vientre hinchado, sensación dolorosa, náuseas o vómitos.

Consultar con su médico tan pronto le sea posible.

### PRECAUCIONES

En pacientes con insuficiencia renal puede haber acumulación de iones aluminio y magnesio en el organismo.

Peligro de hipofosfatemia (anorexia, malestar general, debilidad muscular, etc.) en pacientes con dieta pobre en fosfatos, diarrea, malabsorción o trasplante renal.

No superar la dosis recomendada.

No utilizar más de 2 semanas sin consultar al médico.

Debe comunicarse al médico la aparición de algún síntoma que indique hemorragia, como por ejemplo, unas deposiciones negras como la brea o vómitos como posos de café.

Se recomienda determinaciones bimensuales de los niveles séricos de fósforo, especialmente en pacientes sometidos a hemodiálisis.

Ancianos: riesgo de empeoramiento de la osteoporosis tras el uso prolongado de antiácidos con aluminio debido a la depleción de fósforo y calcio.

## **INTERACCIONES**

Es importante que consulte a su médico, antes de tomar este producto, si se encuentra tomando otra medicación, ya que en caso de administración simultánea puede aumentar o disminuir la absorción oral de las tetraciclinas, digoxina, sales de hierro e isoniazidas.

Si le prescriben otra medicación mientras está usando este preparado, comunique a su médico que toma este medicamento.

Espaciar al menos 2 horas la administración de ambos fármacos.

## **EFFECTOS SECUNDARIOS**

Excepcionalmente, estreñimiento, diarrea o regurgitaciones.

## **ADVERTENCIAS**

### **IMPORTANTE PARA LA MUJER**

Si está usted. embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos puede ser peligroso para el embrión o feto y debe ser vigilado por su médico.

Lactancia: No es aconsejable su uso.

## **INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO**

Ya que su absorción es casi nula, es imposible cualquier intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

## **PRESENTACION**

Envases con 30 comprimidos.

**Sin receta médica.**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**

Logo de SALVAT con dirección completa