



CUSICROM FUERTE Nasal (ácido cromoglicóico)

COMPOSICIÓN .- Cada 100 ml contienen 4 g de ácido cromoglicóico (DCI), sal sódica (cromoglicato sódico).

Excipientes: cloruro de benzalconio, polisorbato 80, edetato sódico y agua purificada.

PROPIEDADES.- El ácido cromoglicóico (cromoglicato sódico) inhibe la degranulación de los mastocitos sensibilizados, impidiendo la liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación. Presenta muy buena tolerancia y puede combinarse con otros medicamentos administrados por vía tóica o vía general.

El ácido cromoglicóico (cromoglicato sódico) permite el tratamiento y la profilaxis de las rinitis alérgicas de todo tipo.

INDICACIONES.- Tratamiento y prevención de las rinitis alérgicas de todo tipo. Rinitis estacionales y perennes. Fiebre del heno.

POSOLÓGÍA.- En general se realizarán de 3 a 4 nebulizaciones al día en cada fosa nasal. En caso necesario se puede llegar hasta un máximo de 6 nebulizaciones diarias. Deberá mantenerse una dosificación regular y continuada con el fin de conseguir una protección eficaz y sostenida en las rinitis.

En el tratamiento de rinitis alérgicas perennes se puede retrasar la aparición de los efectos terapéuticos de 2 a 4 semanas.


Durante esta fase inicial puede acompañarse el tratamiento de antihistamínicos o descongestionantes nasales. Después de esta fase inicial debe suprimirse esta medicación complementaria.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Antes de la primera aplicación:

Retirar el capuchón de protección.

Accionar el pulsador las veces necesarias para que se llene el mecanismo de la válvula y pueda producirse una nebulización correcta.



MODO DE EMPLEO:

-Limpiar las fosas nasales con un pañuelo.

Inclinar un poco la cabeza hacia adelante e introducir el difusor en una fosa nasal tapando la otra con el dedo.

-Inspirar y presionar enérgicamente sobre el fondo del frasco.

Respirar por la boca y repetir la misma operación en la otra fosa nasal.



CONTRAINDICACIONES.- Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. No está demostrada su inocuidad en niños menores de 6 años.

INCOMPATIBILIDADES.- No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS.- Puede dar lugar a estornudos, escozor o irritación que desaparecen en los primeros días del tratamiento. Otros efectos secundarios poco frecuentes son: náuseas, dolor de cabeza, erupción cutánea, broncoespasmo, sequedad de mucosa y hemorragia nasal.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO.- Debido a las características de este preparado, no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso tópico de la especialidad. En caso de ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.

CONSERVACIÓN.- Proteger de la luz.

PRESENTACIÓN.- Envase con 15 ml.
Con receta médica.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ALCON CUSÍ, S.A.
c/ Camil Fabra, 58
08320 El Masnou - Barcelona