



COLLAR ANTIPARASITARIO BOLFO, PARA PERROS GRANDES.

Collar contra pulgas y garrapatas.

4.442 g/ Collar
(propoxur) (carbamato de metilo)

FÁRMACOS Y EXCIPIENTES

UN COLLAR DE 45.0 G, CONTIENE:

Fármacos:

Propoxur y carbamato de metilo 4.442 g

Excipientes:

Dibutilo, Propylenglycoloctanoatdecanoat, aceite de soja epoxidado, ácido esteárico, dióxido de titanio, óxido de hierro, óxido de hierro (III), óxido de hierro (II, III), cloruro de polivinilo.

FORMA:

Collar

DIMENSIONES:

Collar de 66 cm (45 g)

CÓMO USARLO Y DURACIÓN:

Lea atentamente el envase antes de usar el producto. La duración del efecto del collar es de 4 meses para pulgas y 10 semanas para garrapatas. El polvo es continuamente liberado por el collar. Las pulgas mueren pasadas unas horas después de colocar el collar. Las garrapatas mueren después de aproximadamente un día, y pueden ser fácilmente quitadas o incluso caer espontáneamente.

RECOMENDADO PARA:

Perros.

AVISO:

No apto para la ganadería.

ATENCIÓN:

Los animales que portan este collar deben mantenerse alejados de los niños pequeños. Este producto está destinado únicamente a animales, mantener alejado de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en animales enfermos o convalecientes (especialmente con órganos de los sistemas digestivo y urinario obstruidos, asma bronquial u otras afecciones bronquiales y cardiovasculares). No recomendado para mascotas en estado de lactancia, embarazadas, cachorros de menos de 3 meses, cachorros con extensas lesiones en la piel. No apto para ganadería.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

En mascotas muy sensibles, puede causar irritación en la piel y picor en la misma, especialmente los primeros días después de la colocación del collar. Si se manifiestan estos síntomas, el collar debe ser quitado hasta que dichos

síntomas desaparezcan. No hay tratamiento específico alguno necesario. Si los efectos secundarios, particularmente aquellos que no se han listado se encuentran en su/s mascota/s, por favor consulte a su veterinario.

MODO DE EMPLEO:

Extraiga el collar del envase de plástico sellado y quite los sobrantes que separan el collar enrollado de sí mismo. El collar debe quedar holgado en el cuello de su mascota, se recomienda una distancia de aproximadamente 2 dedos entre el collar y el cuello de su mascota. En caso de ser necesario, corte el sobrante del collar. En los primeros días de uso del collar, examine la piel alrededor del collar. Revise regularmente la correcta posición del collar. La duración de la protección depende de la longitud y condición del pelaje de su mascota, de la actividad de la misma y de la infestación de parásitos. Para conseguir una protección optima en perros con pelaje largo, denso o enredado, bañe a su mascota con champú antes de aplicar el collar. Si el efecto del collar se reduce, cambie el collar por uno nuevo. En caso de bañar a su mascota, quite el collar, y vuélvalo a colocar cuando esté completamente seco. En caso de que su mascota suela encontrarse mojada (lluvias, baños, etc.), la efectividad del collar puede reducirse.

INSTRUCCIONES DE USO:

Además de las pulgas que se encuentran en el animal, en el entorno de la mascota se encuentran huevos, larvas y crisálidas. Éstos crecen después de un tiempo y generan más pulgas. Para un control efectivo sobre las pulgas, los alrededores de la mascota deben ser tratados con productos específicos para este fin.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO:

No se requieren condiciones especial de almacenamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños. No utilizar una vez pasada la fecha de caducidad especificada en el envase.

PRECAUCIONES DE USO EN ANIMALES:

Producto de uso exclusivamente externo, no debe ser ingerido por animales o humanos.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

Procure evitar el contacto directo con la piel. Para colocarlo, procure utilizar guantes de protección. A la hora de tratar con su mascota, procure tocar el collar lo mínimo posible. Lávese las manos después de manejar el producto. Personas sensibles deben evitar cualquier contacto con el collar. Si entra en contacto con su piel accidentalmente enjuague inmediatamente con agua. El collar BOLFO contra pulgas y garrapatas no debe ser manipulado por mujeres embarazadas durante su tercer trimestre. Las mascotas que lleven el collar BOLFO contra pulgas y garrapatas, deben mantenerse alejadas de los niños.

**USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:**

Estudios de laboratorio con diferentes especies de animales muestran que no existen efectos secundarios durante el embarazo. Los Carbamatos, pueden producir pequeñas contracciones musculares, por lo que el collar BOLFO contra pulgas y garrapatas no debe ser usado en mascotas con un estado avanzado de embarazo. No usar animales lactantes.

REACCIONES CON OTROS PRODUCTOS:

No debe ser utilizado en caso de utilizar otros insecticidas o acaricidas. En caso de ingestión accidental puede llevar a síntomas de envenenamiento por Carbamato, como salivación, constricción de las pupilas, vómito o diarrea. En estos casos, consulte inmediatamente a su veterinario.

Antídoto: Sulfato de Atropina.