

# Baycidal WP25

**Baycidal WP25 - 500 g - Contra larvas de moscas y escarabajos del estiércol**

## **Plaguicida de uso ganadero**

El fabricante garantiza la calidad de sus productos vendidos en su envase de origen así como su conformidad a la autorización de venta del Ministerio de Agricultura.

**Uso exclusivo por personal especializado**

## **Frases de riesgo**

**Nocivo:** riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

**Muy tóxico** para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

## **Consejos de prudencia**

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar el polvo. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente o mal estar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrole la etiqueta).

## **Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:**

Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con náuseas, vómitos y diarrea. Irritación tracto urinario. Metahemoglobinemia.

### **Primeros auxilios**

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión y si la persona está consciente: provoque el vómito.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración.
- Si fuera necesario respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

### **Consejos terapéuticos:**

En caso de metahemoglobinemia, administre azul de metileno al 1%.

Administre una solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico.

Tratamiento sintomático.

**EN CASO DE INTOXICACION, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.**

**TELÉFONO 91 562 04 20**

## **Consideración especial**

El producto es tóxico para crustáceos.

## **Protección de cursos de agua**

No ensuciar cursos de agua, fuentes y similares con restos del producto o envases vacíos.

### **Eliminación de residuos**

Es obligatorio enjuagar enérgicamente 3 veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe.

Inutilizar los envases y depositarlos en lugar seguro y no contaminante. Se debe seguir la normativa local para la eliminación de residuos químicos.

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

### **Indicaciones**

Baycidal impide el desarrollo de las larvas de la mosca doméstica y las de los establos que se desarrollan en el estiércol purines y otras materias orgánicas.

Baycidal es idóneo para el uso en establos de animales de producción como cerdos, vacuno, aves, ovino y conejos.

Las moscas adultas que emergen de las pupas así como aquellas que ingresan desde el exterior deben ser controladas con insecticidas adulticidas.

El tratamiento será más efectivo mientras más temprano en la temporada de moscas se realice.

Con esto se impide que las poblaciones de moscas aumenten de forma excesiva.

Baycidal es efectivo también contra larvas de cucarachas y en tratamientos de locales ganaderos (criaderos, perreras, cuadras, etc...) infestados por pulgas.

Baycidal WP 25 es una especialidad larvicida, resultado de la investigación de Bayer AG.

Su componente activo, triflumurón, pertenece al grupo químico de las benzoilureas.

Este compuesto ya conocido en el sector ganadero, se utiliza por su acción antilarvaria contra las moscas y tenebriones, en los gallineros, pocilgas, establos, etc. El triflumurón inhibe la síntesis de la quitina e impide la muda de las larvas jóvenes.

Es un larvicida que impide la aparición de insectos adultos.

### **Composición**

Baycidal WP 25 contiene 25% (p/p) de triflumurón en forma de polvo hidrosoluble.

### **Recomendaciones para el tratamiento de tanques de purín**

Calcular la cantidad de purín que se produce al día. Mezclar Baycidal con agua y luego agregarlo al purín (8 g de Baycidal en 1 litro de agua para 1000 litros de purín).

Asegúrese que el producto quede debidamente repartido.

Una vez que la población de moscas ha disminuido visiblemente, la dosis inicial de Baycidal puede disminuirse a 4 g de producto/1000 litros de purín.

Respetar las normas de uso, dosis, condiciones y precauciones de empleo descritas en el envase, que se ha establecido en función de las características del producto y de las aplicaciones para las que está indicado. No se debe administrar a los animales, no debe ser aplicado en los comedores ni en abrevaderos, si no se lavan con agua abundante.

No debe emplearse en presencia de alimentos o de forrajes.

### **Tratamiento de superficies**

Dosificación.

En general se recomienda 20 g de Baycidal en 10 litros de agua para tratar 10 m<sup>2</sup> de superficie del estercolero.

El primer tratamiento debe realizarse 3-7 días después de haber estabulado los animales o de la limpieza del estiércol, repitiendo el tratamiento 2 semanas más tarde.

Cuando se haya logrado el control de las moscas, la dosis de producto puede ser reducida a 10 g/1-10 litros de agua (suficientes para cubrir 10 m<sup>2</sup>).

### **Plazo de seguridad**

1 -2 horas después de la aplicación en habitación cerrada.

Caja exterior 8 unidades de 500 g.

**PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE  
NOCIVO**

**Dosis y modo de empleo**

Dosis de empleo: 2 g de Baycidal WP 25 por m<sup>2</sup> para la desinsectación de las instalaciones ganaderas (establos, pocilgas, gallineros,...).

Baycidal WP 25 se aplica en pulverización:

- En las camas de paja de aves de corral para carne, antes de la entrada de los polluelos, a la posología de 200 g de Baycidal WP25 en 20 litros de agua por 100 m<sup>2</sup> de superficie.
- En las fosas de deyecciones después de vaciar la fosa y de la limpieza, a la posología de 200 g de Baycidal WP 25 en 100 litros de agua por 100 m<sup>2</sup> de superficie de la fosa.
- En los estercoleros y depósitos de almacenamiento exteriores, cada dos semanas, a la posología de 200 g de Baycidal WP 25 en 100 litros de agua cada 100 m<sup>2</sup> de superficie a tratar.

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario esta obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

**Importado** de Alemania

Bayer CropScience AG

® Marca Registrada de Bayer

**Distribuido por:**

Química Farmacéutica Bayer, S.L.

Av. Baix Llobregat, 3-5

08970 Sant Joan Despí

Tel.: 93 495 65 00

**Registrado por:**

Bayer CropScience S.L.

Polígono Ind. El Pla, Parc. 30

46290 Alcácer (Valencia) - España

Tel.: 96 196 53 00

**Composición centesimal**

Trifl umurón . . . . . 25% (p/p)

Excipiente c.s.p . . . . . 100% (p/p)

**Nº Regº en la S.G.S.A.: 9469**