

## **Voltaren® 24 Horas**

Diclofenaco Sódico

Parche

Venta Libre

Japonesa

Industria

Alivio del dolor y la inflamación localizada en cuello y espalda, hombro, codo, columna (lumbalgia) y rodilla.

### **Fórmula/Composición:**

Cada parche contiene:

Diclofenaco sódico 15 mg.

Excipientes: levomentol, N-metil-2-pirrolidona, ésteres de propilenglicol de ácidos grasos, ácido cítrico anhidro, bloque del copolímero de estireno-isopreno-estireno, poli-isobutileno, goma esteárica, 2-benzimidazoletiol, butilhidroxitolueno, parafina líquida c.s.

### **USO DEL MEDICAMENTO**

LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.

**Acción Terapéutica:** Analgésico antiinflamatorio de uso tópico.

#### **Indicaciones:**

Analgésico y antiinflamatorio de uso tópico.

Alivio del dolor y la inflamación localizada en cuello y espalda, hombro, codo, columna (lumbalgia) y rodilla.

**Vía de Administración:** Tópica.

#### **Dosis y modo de empleo:**

##### **Adultos:**

Colocar un parche sobre el área afectada cada 24 horas.

Modo de uso: abra el sobre sellado, tome un parche, remueva la película protectora plástica. Trate de no tocar la parte adhesiva del parche. Colocar en el área afectada.

El parche debe ser utilizado inmediatamente después de haber removido la película protectora y debe de aplicarse en piel limpia, seca e intacta. Lavarse las manos luego de aplicar o remover el parche.

Siga correctamente el modo de empleo.

#### **Efectos adversos:**

Si usted tiene alguno de los siguientes signos de alergia, DETENGA el uso de Voltaren® 24 Horas y contacte inmediatamente a un médico:

Urticaria o sarpullido en la piel con ampollas; dificultad respiratoria o asma e hinchazón de la cara, labios, lengua o cuello.

Si alguno de los siguientes efectos adversos ocurren consulte lo más pronto posible a su médico:

Dermatitis (rash en la piel, eccema, exantema); prurito (picazón o comezón); rubor (enrojecimiento); sequedad de la piel; irritación de la piel.

La piel puede volverse más sensible a la luz del sol (fotosensibilidad), con posibles signos como quemadura de sol con picazón o comezón, inflamación, ampollas y pigmentación. Si cualquiera de estas reacciones secundarias se tornan más serias o si nota cualquier otra reacción secundaria que no esté enumerada en este inserto, por favor indíquelo a su profesional de la salud.

**Contraindicaciones:**

Alergia o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos.

Embarazo y lactancia.

Pacientes con asma por utilizar ácido acetilsalicílico (ataque de asma causado por drogas antiinflamatorias no esteroideos).

**Precauciones y Advertencias:**

Sólo para uso externo. No ingerir. Uso tópico.

No se aplique en los ojos, mucosas, ni en la piel irritada o heridas abiertas. Aplicar sobre piel sana.

No exceda la dosis indicada.

Si los síntomas persisten o empeoran después de 7 días, consulte a su médico.

No se recomienda el uso de Voltaren® 24 Horas parches en menores de 15 años.

Antes de usar Voltaren® 24 Horas en personas de edad avanzada consulte a su médico.

**Interacciones:**

Si Ud. está tomando antibióticos de la familia de las Quinolonas puede sufrir convulsiones al consumir este medicamento. Consulte a su médico.

**Embarazo y lactancia:**

Este producto no debe ser utilizado si está embarazada o en período de lactancia. Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de usar este medicamento.

**En caso de sobredosis**, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Hospital de Pediatría Dr. R. Gutiérrez- T.E. (011) 4962-6666 ó (011) 4962-2247; Hospital A .Posadas- T.E. (011) 4654-6648 ó (011) 4658-7777.

**Envases:**

Estuche con 1 sobre metálico laminado con 2 parches por sobre.

**MANTENER ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.**

Conservar a temperatura ambiente a no más de 25°C.

Almacenar los parches en el empaque original.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 34.982

Hecho en Japón por:

Dojin Iyaku-Kako Co. Ltd.

2-2 5chome Yayoi-cho Nakano-ku.  
Tokio, Japón.

Importado y distribuido por:  
Novartis Argentina, S.A. Ramallo 1851 C.P. C1429DUC -Buenos Aires –  
Línea de atención al consumidor 0800-444-4024 –  
Directora Técnica: Bautista Marinaro, Farmacéutica, Bioquímica.

Fecha de última revisión: 10/06