

# **BEXIDERMIL gel**

## **Salicilato de trietanolamina**

### **Composición:**

#### **Cada gramo contiene:**

Salicilato de trietanolamina..... 100 mg

Excipientes: Trietanolamina, carbomer, propilenglicol, mentol, alcanfor, metilparaben, y agua desionizada.

### **Propiedades**

Analgésico antiinflamatorio externo que penetra y se absorbe rápidamente, produciendo un alivio inmediato del dolor.

### **Indicaciones**

Dolor, inflamación y edema post-traumático en golpes, contusiones, esguinces. Inflamación de los ligamentos, de las articulaciones, inflamación de los tendones. Dolores reumatoideos, musculares y como complementario de las enfermedades reumáticas articulares.

### **Posología y modo de empleo**

Aplíquese sobre la zona afecta 2 ó 3 veces al día, siendo aconsejable una aplicación adicional a la hora de acostarse. Debe realizarse un suave masaje hasta que se absorba.

### **Contraindicaciones**

Antecedentes de hipersensibilidad a salicilatos.

No utilizar sobre piel lesionada y mucosas.

No utilizar en niños menores de 10 años.

### **Precauciones**

Sólo para uso externo. Si el producto se usa de forma intensa y continuada, puede producirse una ligera descamación de la piel (peeling), reacción normal de la misma al uso de salicilatos que no impide continuar el tratamiento.

Deberá utilizarse en aplicaciones locales, no en grandes zonas.

No utilizar durante el embarazo y lactancia sin consultar al médico.

Si aparece enrojecimiento, agravamiento de los síntomas o si el dolor persiste durante más de 7 días, interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Evitar el contacto con los ojos.

### **Interacciones**

No se han descrito.

### **Efectos secundarios**

Erupciones en el lugar de aplicación como reacción de hipersensibilidad.

**Intoxicación y su tratamiento**

En la práctica es muy improbable que en la administración por vía tópica se produzcan intoxicaciones. En caso de ingestión por vía oral, deberá darse aviso a un facultativo para que proceda a provocar el vómito y/o lavado gástrico si lo juzga necesario o bien consultar al Servicio de Información Toxicológica.  
Teléfono 91 562 04 20.

**Presentación**

**Bexidermil® Gel.** Tubo de 50 g

**Otras presentaciones**

**Bexidermil® pulverizador sin gas.** Frasco de 200 ml

**Bexidermil® Crema.** Tubo de 50 g

**Sin receta médica****Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños**

Fabricado por:  
Laboratorios Sr. ESTEVE, S.A.  
Martorelles (Barcelona)

Titular:  
Isdin SA  
Provençals 33  
08019 Barcelona  
España