

PROSPECTO

YACUTIN EMULSIÓN

Yacutín es un preparado de intensa acción antiparasitaria en el tratamiento de la dermatosis producidas por piojos y sarna, tanto en el hombre como en animales domésticos.

Composición cuantitativa

Cada 100 g contienen:

Lindano 0,3 g

Excipientes: Benzoato de bencilo, octildodecanol, lauriléter macrogol, metilcelulosa, fenoxietanol, agua purificada.

Indicaciones

Dermatosis parasitarias externas, en especial pediculosis (cabeza, pubis, etc) y sarna.

Dosificación y modo de empleo

En caso de afectación generalizada por sarna, antes de su aplicación se efectuará una limpieza minuciosa de todo el cuerpo, con agua y jabón. Con la emulsión contenida en el frasco se fricciónará la piel aplicándose una capa fina, en especial en zonas pilosas, los pliegues de flexión, los espacios interdigitales, zona submamaria y región interglútea. Una vez seca la emulsión sobre el cuerpo, ha de usarse ropa interior limpia. La ropa interior, así como la ropa de cama, han de ser desinfectadas por ebullición, a fin de evitar la reinfección.

Se recomienda afectar este tratamiento durante tres días consecutivos, pudiéndose realizar un baño de limpieza a la mañana siguiente.

Niños pequeños y lactantes. El tratamiento se realizará durante 4 días seguidos, aplicándose la emulsión a la mitad superior del cuerpo los días 1 y 3 y a la mitad inferior los días 2 y 4.

Niños de 3-10 años: El tratamiento se realizará durante dos días seguidos. En ambos casos, el baño de limpieza se realizará a las tres horas de aplicación.

En la pediculosis (piojos) de cabeza o pubis, se harán fricciones con unos 15 g del producto, previa limpieza de la zona afectada. El lavado posterior a la aplicación no se efectuará antes de las tres horas y puede retrasarse hasta pasados dos días, en caso preciso, a fin de asegurar el efecto antiparasitario. Este proceder puede repetirse varias veces.

Un tratamiento cuya duración supere las pautas establecidas, deberá ser consultado con el médico.

Exclusivamente uso externo.

Agítese antes de usarse.

Contraindicaciones y precauciones

Aunque su empleo no está formalmente contraindicado, durante el embarazo se recomienda realizar el tratamiento bajo control médico. La misma precaución ha de observarse en caso de pacientes menores de 2 años. Debe procurarse que la aplicación del preparado se efectúe con la piel fresca y fría, nunca después de un baño caliente

En caso de lactancia, debe cuidarse que la piel de la región mamaria esté limpia y libre de Yacutín antes de amamantar al niño. La existencia de lesiones dérmicas generalizadas favorece la absorción del producto y, por lo tanto, contraindican su uso.

Yacutín no debe ponerse en contacto con las mucosas, especialmente ojos y boca.

Por contener benzoato de bencilo puede irritar los ojos, la piel y las mucosas. Puede aumentar el riesgo de coloración amarillenta de la piel (ictericia) en recién nacidos.

Incompatibilidades e interacciones

No se han descrito

Efectos secundarios

Son escasos los efectos secundarios descritos. A pesar de la intensa acción antiparasitaria, excepcionalmente puede provocar irritación de la piel.

Intoxicación y su tratamiento

El mal uso o la grave ingestión accidental del contenido del frasco da lugar a un cuadro grave de irritación gastrointestinal seguido, en ocasiones, de convulsiones, hipotensión, deshidratación y shock.

El tratamiento de la intoxicación consiste en la evacuación del producto, mediante lavado gástrico y enema salino, fluidoterapia, analépticos cardiocirculatorios y sedantes. El diazepam es un antagonista eficaz.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91.562.04.20

Presentación

Envase de 100g

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños

BOOTS HEALTHCARE, S.A.

Dr.Zamenhof, 36

28027 Madrid