

Vigoro
UltraTurf

Summer Fertilizer
Plus Insect Control 28-3-8

Fertilizante de Verano
Más Control de Insectos

TREATS
UP TO 5,000
SQ FT

Trata hasta
5,000
pies²

FPO UPC CODE
0 13013 52332 9

Vigoro
UltraTurf

Summer Fertilizer

Plus Insect Control 28-3-8

Fertilizante de Verano

Más Control de Insectos

Greens and Protects
DURING SUMMER MONTHS

Proporciona Color Verde y Protege el Césped
Durante los Meses de Verano



Specially Formulated for Warm Season Application

Especialmente Formulado para Aplicación
durante la Temporada Cálida



Kills in 24 Hours

Elimina insectos en 24 Horas



**Kills over 40 Lawn Invading Insects
Including Ants, Grubs, Ticks, Spiders,
Chinch Bugs & Sod Webworms**

Elimina más de 40 Insectos Invasores del Césped,
Incluidas Hormigas, Larvas, Garrapatas, Arañas,
Chinches y Gusanos Peludos del Césped



For outdoor residential use only.

Active Ingredient:

Lambda-Cyhalothrin 0.03%

Other Ingredients. 99.97%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional
precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el panel posterior para ver
declaraciones de precaución adicionales.

Net Wt 13 lb (5.8 kg)

TREATS UP TO 5,000 SQ FT
Trata hasta 5,000 pies²



APPLY IN SUMMER
APLICAR EN VERANO

FPO UPC CODE
0 13013 52332 9

TREATS
UP TO 5,000
SQ FT

Trata hasta
5,000
pies²

Fertilizante de Verano
Más Control de Insectos

Summer Fertilizer
Plus Insect Control 28-3-8

Vigoro
UltraTurf

Vigoro
UltraTurf

Summer Fertilizer

Plus Insect Control 28-3-8

Fertilizante de Verano

Más Control de Insectos

English

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

PROJECT GUIDE

For a thicker, greener more beautiful lawn, follow **Vigoro's Annual Lawn Care Program**. It's easy to follow and can be started at anytime by simply applying the product that corresponds with the current season!

SPRING

Early Spring

CRABGRASS PREVENTER

Late Spring

WEED & FEED

Summer

LAWN INSECT CONTROL

Early Fall

LAWN FERTILIZER

Late Fall

WINTERIZER

Vigoro offers complete annual lawn care programs for all areas. See your local store associate or visit **Vigoro.com** for more information about a customized program that is right for your area and turf type.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

STOP Keep people and pets off treated areas until the material is washed into the turf and grass has dried.

BEFORE YOU APPLY

Read and follow these guidelines when you use this product:

- Apply only to lawns and ornamental turf.
- Apply with a fertilizer spreader – **Never apply by hand.**
- Do not apply more than six (6) times per year per location.
- Do not apply before or after rain.
- Do not allow product to run off from target site.
- **In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh or stream that drains directly into a coastal marsh.**


WHAT IT DOES

Dual action formula kills insects while feeding your lawn:

1. Exclusive active ingredient works fast and kills lawn damaging and nuisance insects on contact.
2. Vigoro® Ultra Turf™ Summer Fertilizer Plus Insect Control 28-3-8 helps strengthen and protect your lawn from the hot, harsh conditions of summer while improving its tolerance to disease and drought conditions.

WHEN TO APPLY

This product should be applied in the summer when insect activity first appears or when you first notice insect damage.



Insects Controlled

This product will control the following insects when used as directed:

Ants**, Armyworms (Fall & Yellow-striped), Billbugs, Centipedes, Chinch bugs, Cockroaches, Crickets, Cutworms, Dung beetles (*Ataenius spretulus*), Earwigs, European crane flies, Fleas, Lawn moths (sod webworms), Grasshoppers, Green June beetles, Grubs (Japanese beetle grubs, Green June beetle grubs), Hyperodes weevils, Japanese beetles (adults), Leafhoppers, Millipedes, Mites, Mole crickets, Palmetto bugs, Pillbugs, Roaches (German and American), Silverfish, Spittlebugs, Springtails, Ticks and Waterbugs.

**Argentine, Southern, Field, Allegheny Mound, Florida Carpenter, Black Carpenter, Cornfield, Honey, Pavement, Red Imported Fire Ant, Nuisance

Treatment Areas	Pests	How To Use	Use Rate
Overall Lawn Application	Billbugs, Grubs (Japanese Beetle Grubs, Green June Beetle Grubs), <i>Ataenius spretulus</i> (Dung Beetles), Hyperodes Weevils, Mole Crickets, Chinch Bugs	Immediately water grass thoroughly after application. For <i>billbug control</i> , apply when activity is first observed or when chewed or brown grass indicates damage from these insects. For <i>grub control</i> , except dung beetle, treat any time between late July and early October. For <i>dung beetle grub control</i> , apply in spring or early summer when damage is first noticed. Water grass thoroughly with 1/4 to 1/2 inch of water immediately after application. Treat again in late summer or early fall if a second generation occurs.	Apply at the rate of 4 lb per 1,000 sq ft of lawn.
	Ants**, Armyworms (Fall & Yellow-striped), Centipedes, Cockroaches, European Crane Flies, Crickets, Cutworms, Earwigs, Fleas, Lawn Moths (Sod Webworms), Grasshoppers, Palmetto Bugs, Pillbugs, Roaches (German and American) Spittlebugs, Mites, Green Japanese Beetles (adult) June Beetles, Leafhoppers, Millipedes, Silverfish, Springtails, Ticks, Waterbugs	Apply with a fertilizer spreader. See spreader setting chart. Apply when grass is dry. Water lawn immediately after application.	Apply at the rate of 2.6 lb per 1,000 sq ft (an area 20' by 50').
**Argentine, Southern, Field, Allegheny Mound, Florida Carpenter, Black Carpenter, Cornfield, Honey, Pavement, Red Imported Fire Ant, Nuisance			

Fire Ant Note: Broadcast applications will control foraging fire ants and help prevent neighboring colonies from re-establishing in your lawn. For best results treat mounds with a mound control product prior to applying this product.

How to Apply

1. Determine size of area to be treated – measure length and width in feet, then multiply to determine coverage area in sq ft, then subtract non-lawn areas. This bag covers up to 5,000 sq ft.



2. Use the spreader setting chart and set spreader to appropriate setting.
3. Apply evenly over dry grass, avoiding streaking, skips and overlaps – thorough coverage is important.
4. Water in after application.
5. Keep children and pets off treated areas until this material is washed into turf and grass is dry.

It is important to follow directions as indicated on this quality lawn care product as over-application may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate. Differences may occur due to condition of spreader, speed at which applied, and roughness of area treated. Be sure to check spreader before beginning, adjusting if necessary. Consult owners' manual.

NEVER APPLY BY HAND

To avoid gaps and streaks, first spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk at a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn.

SPREADER SETTINGS:

AJUSTES DEL ESPARCIDOR:

SPREADER	2.6 lb/1000 sq ft	4 lb/1000 sq ft
ROTARY SPREADERS ESPARCIDORES ROTATIVOS		
EARTHWAY 2050	8	11 1/2
SCOTTS SPEEDYGREEN 1000	4	5 3/4
SCOTTS SPEEDYGREEN 2000	4	5 3/4
SCOTTS SPEEDYGREEN 3000	4	5 3/4
VIGORO 4300	3	5 3/4
DROP SPREADERS ESPARCIDORES POR GOTO		
SCOTTS ACCUGREEN 1000	5	7
SCOTTS ACCUGREEN 2000	5	7
SCOTTS ACCUGREEN 3000	5	7



Español

ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USARLO.

GUÍA DEL PROYECTO

Para obtener un césped más espeso, más verde y más hermoso, siga el **Programa de Cuidados de Césped Anual de Vigoro**. ¡Es fácil de seguir y puede comenzar en cualquier momento simplemente aplicando el producto que corresponde a la temporada actual!

PRIMAVERA

Principios de la Primavera

INHIBIDOR DE HIERBAS SILVESTRES

Fines de la Primavera

HERBICIDA Y FERTILIZANTE

Verano

CONTROL DE INSECTOS DEL CÉSPED

Principios de Otoño

FERTILIZANTE PARA CÉSPED

Fines de Otoño

WINTERIZER

Vigoro ofrece programas anuales completos de cuidado del césped para todas las áreas. Consulte a un asociado de su tienda local o visite **Vigoro.com** para obtener más información acerca de algún programa personalizado que sea adecuado para su área y tipo de césped.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de forma diferente a lo indicado en su etiqueta constituye una violación de la ley Federal.

ALTO Mantenga las personas y las mascotas alejadas de las áreas tratadas hasta que el césped absorba el material y se seque.

ANTES DE APLICAR

Lea y siga estas pautas cuando use este producto:

- Aplique sólo en césped y césped decorativo.
- Aplique con un esparcidor de fertilizante. **Nunca aplique a mano.**
- No aplique más de seis (6) veces por año por ubicación.
- No aplique antes ni después de la lluvia.
- No permita que el producto se desplace de la zona objetivo.
- **En el Estado de Nueva York, este producto no debe aplicarse en césped dentro de los 100 pies de una marisma costera o arroyo que drene directamente en una marisma costera.**


LO QUE HACE

La fórmula de doble acción elimina a los insectos mientras nutre su césped:

1. Su ingrediente activo exclusivo actúa rápidamente y elimina por contacto los insectos molestos que dañan el césped.
2. El Fertilizante de Verano Más Control de Insectos 28-3-8 Ultra Turf™ de Vigoro® ayuda a fortalecer y a proteger su césped del calor, las condiciones severas del verano, mejorando su tolerancia a las enfermedades y a las condiciones de sequía.

CUÁNDO APLICAR

Este producto debe aplicarse en verano cuando la actividad de los insectos recién aparece o apenas observe los primeros daños ocasionados por los insectos.



Insectos Controlados

Este producto controlará los siguientes insectos si se usa según lo indicado.

Hormigas** Orugas Militares (de Otoño y con Rayas Amarillas), Escarabajos Picudos, Ciempíes, Chinchas, Cucarachas, Grillos, Orugas Nocturnas, Escarabajos Peloteros (*Ataenius spretulus*), Tijeretas, Tipulas Europeas, Pulgas, Palomilla (Gusanos Peludos del Césped), Saltamontes, Escarabajos Verdes de Junio, Larvas (Larvas de Escarabajo Japonés y Larva del Escarabajo Verde de Junio), Gorgojos de los Andes, Escarabajos Japoneses (Adultos), Saltarillas, Milpiés, Ácaros, Grillos Topo, Cucarachas Palmetto, Bichos Bola, Cucarachas (Alemanas y Estadounidenses), Lepismas, Mión de los Pastos, Colembolos, Garrapatas y Chinchas de Agua.

**Hormigas Argentinas, Hormigas del Sur, Hormigas del Campo, Hormigas de los Montes Allegheny, Hormigas Carpinteras de la Florida, Hormigas Carpinteras Negras, Hormigas del Maíz, Hormigas de la Miel, Hormigas de Pavimento, Hormigas Coloradas de Fuego Importadas, Molestas

Áreas de Tratamiento	Pestes	Cómo Usarlo	Proporción de Uso
Aplicación General sobre Césped	Escarabajos Picudos, Larvas (Larvas de Escarabajo Japonés y Larvas de Escarabajo Verde de Junio), <i>Ataenius spretulus</i> (Escarabajos Peloteros), Gorgojos de los Andes, Grillos Topo, Chinchas	Riegue el césped inmediatamente con abundante agua después de la aplicación. Para el control de los escarabajos picudos, aplique apenas observe la actividad o cuando el césped marrón o machucado indique daño de estos insectos. Para el control de las larvas, excepto de los escarabajos peloteros, trate en cualquier momento entre fines de julio y principios de octubre. Para el control de las larvas de escarabajos peloteros, aplique en primavera o a principios del verano apenas comience a observar daños. Riegue el césped con abundante agua (entre 1/4 y 1/2 pulgada) inmediatamente después de la aplicación. Trate nuevamente a fines del verano o a principios del otoño si se produce una segunda aparición.	Aplique en una proporción de 4 lb por cada 1,000 pies² de césped.
	Hormigas**, Orugas Militares (de Otoño y con Rayas Amarillas), Ciempíes, Cucarachas, Tipulas Europeas, Grillos, Gusanos Cortadores, Tijeretas, Pulgas, Polillas (Gusanos Peludos del Césped), Saltamontes, Cucarachas Palmetto, Bichos Bola, Cucarachas (Alemanas y Estadounidenses), Mión de los Pastos, Ácaros, Escarabajos Japoneses Verdes (Adultos), Escarabajos de Junio, Saltarillas, Milpiés, Lepismas, Colembolos, Garrapatas y Chinchas de Agua.	Aplique con un esparcidor de fertilizante. Consulte la tabla de ajustes del esparcidor. Aplique cuando el césped esté seco. Riegue el césped inmediatamente después de la aplicación.	Aplique en una proporción de 2.6 lb por cada 1,000 pies² (una superficie de 20 pies por 50 pies).
**Hormigas Argentinas, del Sur, del Campo, de los Montes Allegheny, Carpinteras de la Florida, Carpinteras Negras, del Maíz, de la Miel, de Pavimento, Coloradas de Fuego Importadas, Molestas			

Nota sobre las Hormigas de Fuego: Las aplicaciones en voleo controlarán la incursión de las hormigas de fuego y evitará que las colonias vecinas se vuelvan a arraigar en su césped. Para obtener mejores resultados, antes de aplicar este producto trate los hormigueros con un producto de control para hormigueros.

Cómo Aplicarlo

1. Determine el tamaño de la superficie a tratar: mida el largo y el ancho en pies, luego multiplíquelos para determinar la superficie de cobertura en pies cuadrados y luego réstele las superficies sin césped. Esta bolsa cubre hasta 5,000 pies².



2. Utilice la tabla de ajustes del esparcidor para determinar el ajuste adecuado.
3. Aplique en forma pareja sobre el césped seco, evitando excesos, superposiciones y zonas sin aplicar; es importante lograr una cobertura completa.
4. Riegue después de la aplicación.
5. Mantenga los niños y las mascotas alejados de las áreas tratadas hasta que este material se absorba en el césped y hasta que el césped se seque.

Es importante seguir las instrucciones indicadas en este producto de calidad para el cuidado del césped, ya que una aplicación excesiva puede dañar su césped. Los ajustes del esparcidor son aproximados. Las diferencias pueden darse debido a la condición del esparcidor, la velocidad a la que se aplica el producto y la rugosidad de la superficie tratada. Asegúrese de verificar el esparcidor antes de comenzar y ajústelo si es necesario. Consulte el manual del propietario.

NUNCA APLIQUE CON LA MANO

Para evitar que queden huecos o excesos de aplicación, comience desde el borde del terreno y luego continúe hacia el centro con pasadas paralelas uniformes. Camine a un ritmo estable de modo que aplique el producto uniformemente sobre el césped.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Almacene el producto en el contenedor original en un lugar fresco, seco y cerrado fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Eliminación: Si está vacío: No vuelva a utilizar este contenedor. Colóquelo en un basurero u ofrézcalo para reciclaje si el servicio está disponible.

Si está lleno en parte: Llame a la agencia de desechos sólidos de su zona o llame al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones acerca de cómo eliminar dichos desechos. Nunca coloque el producto que no se utilizó en un drenaje interior o exterior.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Peligroso para Humanos y Animales Domésticos

PRECAUCIÓN. Peligroso si se ingiere. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con ojos o ropa. Lave meticulosamente con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, consumir goma de mascar o tabaco.

Primeros Auxilios

- Si Penetra en los Ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 o 20 minutos. Quite las lentes de contacto (si es que usa) después de los primeros 5 minutos, luego siga enjuagando los ojos. Llame a un Centro de Toxicología o a un médico para que le prescriba un tratamiento.
- Si lo Ingiere:** Llame de inmediato a un Centro de Toxicología o a un médico para que le prescriba un tratamiento. Si puede tragar, beba un vaso de agua. No provoque el vómito salvo que así se lo indiquen el Centro de Toxicología o el médico. No intente suministrar algo por boca a una persona inconsciente.

Tenga a mano el contenedor o la etiqueta del producto cuando llame al Centro de Toxicología o al médico, o cuando busque tratamiento.

Peligros Ambientales

Este producto es tóxico para los peces y altamente tóxico para otros organismos acuáticos como ostras y camarones. Úselo con cuidado al aplicar en áreas con césped adyacentes a cualquier masa de agua. La deriva o el desplazamiento pueden afectar en forma adversa a los organismos de sitios acuáticos adyacentes. No lo aplique directamente en el agua. No lo aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan la deriva del área tratada. No contamine el agua cuando limpie el equipo o cuando elimine el agua usada para la limpieza de los equipos.

AVISO: El comprador asume toda responsabilidad por la seguridad y el uso que no esté de acuerdo con las instrucciones.

Vigoro® Ultra Turf™ Summer Fertilizer Plus Insect Control 28-3-8

GUARANTEED ANALYSIS:

Total Nitrogen (N) 28.0%
1.18% Ammoniacal Nitrogen
26.82% Urea Nitrogen*
Available Phosphate (P₂O₅) 3.0%
Soluble Potash (K₂O) 8.0%

Derived from: Polymer-coated Urea, Polymer-coated Sulfur-coated Urea, Urea, Ammonium Phosphate and Muriate of Potash.

*Contains 6.5% slowly available nitrogen from coated urea.

Distributed and guaranteed by Spectrum Group
Division of United Industries Corporation, PO Box 142642
St. Louis, MO 63114-0642

F1074

Visit Us On The Internet
or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visitenos En El Internet
Para Información En Español

vigoro.com or 1-800-561-1333



If you apply Vigoro Ultra Turf Summer Fertilizer Plus Insect Control 28-3-8 as directed and are not completely satisfied, send a proof of purchase from this package and the original cash register receipt to the address below. We will refund the purchase price you paid.


When applied as directed, this product meets the guidelines for metals adopted by the Association of American Plant Food Control Officials. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.regulatory-info-sb.com>.

Ultra Turf™ is a trademark of Martin Resources, Inc. and is used under license.

EPA Reg. No. 9688-220-8845

EPA Est. Nos. 9198-OH-1 (M), 9198-OH-2 (B), 9198-AL-1 (A), 49991-TX-1 (AZ), 49991-TX-2 (BC), 45065-MN-1 (BD), 59144-GA-1 (BE), 6665-NY-1 (BF), 35512-FL-2 (BG), 8378-IN-1 (AS), 43854-MO-1 (BH), 49710-TX-1 (AT), 49710-TX-3 (AU), 3234-UT-1 (AV), 3234-AZ-1 (AW), 8660-AL-1 (BN), 8660-OH-1 (BO), 74764-CA-1 (BK), 74764-FL-1 (BL), 9404-FL-1 (AX), 35497-OR-1 (AY)

Circled letter is first letter of lot number. 11-7467 North ©2005 UIC



Vigoro
UltraTurf

Summer Fertilizer
Plus Insect Control 28-3-8

Fertilizante de Verano
Más Control de Insectos

Vigoro
UltraTurf

Summer Fertilizer

Plus Insect Control 28-3-8

Fertilizante de Verano

Más Control de Insectos

TREATS Trata hasta
UP TO 5,000 5,000
SQ FT pies²

FPO UPC CODE
0 13013 52332 9

Fertilizante de Verano
Más Control de Insectos

Fertilizer
28-3-8

Más Control de Insectos

Greens and Protects

DURING SUMMER MONTHS

Proporciona Color Verde y Protege el Césped
Durante los Meses de Verano



Specially Formulated for Warm Season Application
Especialmente Formulado para Aplicación
durante la Temporada Cálida



Kills in 24 Hours
Elimina insectos en 24 Horas



**Kills over 40 Lawn Invading Insects
Including Ants, Grubs, Ticks, Spiders,
Chinch Bugs & Sod Webworms**
Elimina más de 40 Insectos Invasores del Césped,
Incluidas Hormigas, Larvas, Garrapatas, Arañas,
Chinches y Gusanos Peludos del Césped



For outdoor residential use only.

Active Ingredient:

Lambda-Cyhalothrin 0.03%

Other Ingredients 99.97%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional
precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el panel posterior para ver
declaraciones de precaución adicionales.

Net Wt 13 lb (5.8 kg)

TREATS UP TO 5,000 SQ FT
Trata hasta 5,000 pies²



APPLY IN SUMMER
APLICAR EN VERANO

Vigoro
UltraTurf

Summer Fertilizer

Plus Insect Control 28-3-8

Fertilizante de Verano

Más Control de Insectos

Vigoro
Summer Fertilizer
Plus Insect Control 28-3-8
UltraTurf

TREATS UP TO 5,000 SQ FT
Trata hasta 5,000 pies²

FPO UPC CODE
0 13013 52332 9

English



READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

PROJECT GUIDE

For a thicker, greener more beautiful lawn, follow **Vigoro's Annual Lawn Care Program**. It's easy to follow and can be started at anytime by simply applying the product that corresponds with the current season!

SPRING

Early Spring
CRABGRASS PREVENTER



Late Spring
WEED & FEED



Summer
LAWN INSECT CONTROL



FALL

Early Fall
LAWN FERTILIZER



Late Fall
WINTERIZER



Vigoro offers complete annual lawn care programs for all areas. See your local store associate or visit **Vigoro.com** for more information about a customized program that is right for your area and turf type.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.



Keep people and pets off treated areas until the material is washed into the turf and grass has dried.

BEFORE YOU APPLY

Read and follow these guidelines when you use this product:

- Apply only to lawns and ornamental turf.
- Apply with a fertilizer spreader – **Never apply by hand.**
- Do not apply more than six (6) times per year per location.
- Do not apply before or after rain.
- Do not allow product to run off from target site.
- **In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh or stream that drains directly into a coastal marsh.**


WHAT IT DOES

Dual action formula kills insects while feeding your lawn:

1. Exclusive active ingredient works fast and kills lawn damaging and nuisance insects on contact.
2. Vigoro® Ultra Turf™ Summer Fertilizer Plus Insect Control 28-3-8 helps strengthen and protect your lawn from the hot, harsh conditions of summer while improving its tolerance to disease and drought conditions.

WHEN TO APPLY

This product should be applied in the summer when insect activity first appears or when you first notice insect damage.



Insects Controlled

This product will control the following insects when used as directed:

Ants**, Armyworms (Fall & Yellow-striped), Billbugs, Centipedes, Chinch bugs, Cockroaches, Crickets, Cutworms, Dung beetles (*Ataenius spretulus*), Earwigs, European crane flies, Fleas, Lawn moths (sod webworms), Grasshoppers, Green June beetles, Grubs (Japanese beetle grubs, Green June beetle grubs), Hyperodes weevils, Japanese beetles (adults), Leafhoppers, Millipedes, Mites, Mole crickets, Palmetto bugs, Pillbugs, Roaches (German and American), Silverfish, Spittlebugs, Springtails, Ticks and Waterbugs.

**Argentine, Southern, Field, Allegheny Mound, Florida Carpenter, Black Carpenter, Cornfield, Honey, Pavement, Red Imported Fire Ant, Nuisance

Treatment Areas	Pests	How To Use	Use Rate
Overall Lawn Application	Billbugs, Grubs (Japanese Beetle Grubs, Green June Beetle Grubs), <i>Ataenius spretulus</i> (Dung Beetles), Hyperodes Weevils, Mole Crickets, Chinch Bugs	Immediately water grass thoroughly after application. <i>For billbug control</i> , apply when activity is first observed or when chewed or brown grass indicates damage from these insects. <i>For grub control</i> , except dung beetle, treat any time between late July and early October. <i>For dung beetle grub control</i> , apply in spring or early summer when damage is first noticed. Water grass thoroughly with 1/4 to 1/2 inch of water immediately after application. Treat again in late summer or early fall if a second generation occurs.	Apply at the rate of 4 lb per 1,000 sq ft of lawn.
	Ants**, Armyworms (Fall & Yellow-striped), Centipedes, Cockroaches, European Crane Flies, Crickets, Cutworms, Earwigs, Fleas, Lawn Moths (Sod Webworms), Grasshoppers, Palmetto Bugs, Pillbugs, Roaches (German and American) Spittlebugs, Mites, Green Japanese Beetles (adult) June Beetles, Leafhoppers, Millipedes, Silverfish, Springtails, Ticks, Waterbugs	Apply with a fertilizer spreader. See spreader setting chart. Apply when grass is dry. Water lawn immediately after application.	Apply at the rate of 2.6 lb per 1,000 sq ft (an area 20' by 50').
**Argentine, Southern, Field, Allegheny Mound, Florida Carpenter, Black Carpenter, Cornfield, Honey, Pavement, Red Imported Fire Ant, Nuisance			

Fire Ant Note: Broadcast applications will control foraging fire ants and help prevent neighboring colonies from re-establishing in your lawn. For best results treat mounds with a mound control product prior to applying this product.

Español



LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USARLO.

GUÍA DEL PROYECTO

Para obtener un césped más espeso, más verde y más hermoso, siga el **Programa de Cuidados de Césped Anual de Vigoro**. ¡Es fácil de seguir y puede comenzar en cualquier momento simplemente aplicando el producto que corresponde a la temporada actual!

PRIMAVERA

Principios de la Primavera
INHIBIDOR DE
HIERBAS SILVESTRES



Fines de la Primavera
HERBICIDA Y
FERTILIZANTE



Verano
CONTROL DE INSECTOS
DEL CÉSPED



Principios de Otoño
FERTILIZANTE
PARA CÉSPED



Fines de Otoño
WINTERIZER



Vigoro ofrece programas anuales completos de cuidado del césped para todas las áreas. Consulte a un asociado de su tienda local o visite **Vigoro.com** para obtener más información acerca de algún programa personalizado que sea adecuado para su área y tipo de césped.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de forma diferente a lo indicado en su etiqueta constituye una violación de la ley Federal.



Mantenga las personas y las mascotas alejadas de las áreas tratadas hasta que el césped absorba el material y se seque.

ANTES DE APLICAR

Lea y siga estas pautas cuando use este producto:

- Aplique sólo en césped y césped decorativo.
- Aplique con un esparcidor de fertilizante. **Nunca aplique a mano.**
- No aplique más de seis (6) veces por año por ubicación.
- No aplique antes ni después de la lluvia.
- No permita que el producto se desplace de la zona objetivo.
- **En el Estado de Nueva York, este producto no debe aplicarse en césped dentro de los 100 pies de una marisma costera o arroyo que drene directamente en una marisma costera.**


LO QUE HACE

La fórmula de doble acción elimina a los insectos mientras nutre su césped:

1. Su ingrediente activo exclusivo actúa rápidamente y elimina por contacto los insectos molestos que dañan el césped.
2. El Fertilizante de Verano Más Control de Insectos 28-3-8 Ultra Turf™ de Vigoro® ayuda a fortalecer y a proteger su césped del calor, las condiciones severas del verano, mejorando su tolerancia a las enfermedades y a las condiciones de sequía.

CUÁNDO APLICAR

Este producto debe aplicarse en verano cuando la actividad de los insectos recién aparece o apenas observe los primeros daños ocasionados por los insectos.



Insectos Controlados

Este producto controlará los siguientes insectos si se usa según lo indicado.

Hormigas**, Orugas Militares (de Otoño y con Rayas Amarillas), Escarabajos Picudos, Ciempiés, Chinchines, Cucarachas, Grillos, Orugas Nocturnas, Escarabajos Peloteros (*Ataenius spretulus*), Tijeretas, Tipulas Europeas, Pulgas, Palomilla (Gusanos Peludos del Césped), Saltamontes, Escarabajos Verdes de Junio, Larvas (Larvas de Escarabajo Japonés y Larva del Escarabajo Verde de Junio), Gorgojos de los Andes, Escarabajos Japoneses (Adultos), Saltarillas, Milpiés, Ácaros, Grillos Topo, Cucarachas Palmetto, Bichos Bola, Cucarachas (Alemanas y Estadounidenses), Lepismas, Mión de los Pastos, Colémbolos, Garrapatas y Chinchines de Agua.

**Hormigas Argentinas, Hormigas del Sur, Hormigas del Campo, Hormigas de los Montes Allegheny, Hormigas Carpinteras de la Florida, Hormigas Carpinteras Negras, Hormigas del Maíz, Hormigas de la Miel, Hormigas de Pavimento, Hormigas Coloradas de Fuego Importadas, Hormigas Molestas

Áreas de Tratamiento	Pestes	Cómo Usarlo	Proporción de Uso
Aplicación General sobre Césped	Escarabajos Picudos, Larvas (Larvas de Escarabajo Japonés y Larvas de Escarabajo Verde de Junio), <i>Ataenius spretulus</i> (Escarabajos Peloteros), Gorgojos de los Andes, Grillos Topo, Chinchines	Riegue el césped inmediatamente con abundante agua después de la aplicación. <i>Para el control de los escarabajos picudos</i> , aplique apenas observa la actividad o cuando el césped marrón o machucado indique daño de estos insectos. <i>Para el control de las larvas</i> , excepto de los escarabajos peloteros, trate en cualquier momento entre fines de julio y principios de octubre. <i>Para el control de las larvas de escarabajos peloteros</i> , aplique en primavera o a principios del verano apenas comience a observar daños. Riegue el césped con abundante agua (entre 1/4 y 1/2 pulgada) inmediatamente después de la aplicación. Trate nuevamente a fines del verano o a principios del otoño si se produce una segunda aparición.	Aplique en una proporción de 4 lb por cada 1,000 pies ² de césped.
	Hormigas**, Orugas Militares (de Otoño y con Rayas Amarillas), Ciempiés, Cucarachas, Tipulas Europeas, Grillos, Gusanos Cortadores, Tijeretas, Pulgas, Polillas (Gusanos Peludos del Césped), Saltamontes, Cucarachas Palmetto, Bichos Bola, Cucarachas (Alemanas y Estadounidenses), Mión de los Pastos, Ácaros, Escarabajos Japoneses Verdes (Adultos), Escarabajos de Junio, Saltarillas, Milpiés, Lepismas, Colémbolos, Garrapatas y Chinchines de Agua.	Aplique con un esparcidor de fertilizante. Consulte la tabla de ajustes del esparcidor. Aplique cuando el césped está seco. Riegue el césped inmediatamente después de la aplicación.	Aplique en una proporción de 2.6 lb por cada 1,000 pies ² (una superficie de 20 pies por 50 pies).
**Hormigas Argentinas, del Sur, del Campo, de los Montes Allegheny, Carpinteras de la Florida, Carpinteras Negras, del Maíz, de la Miel, de Pavimento, Coloradas de Fuego Importadas, Molestas			

Nota sobre las Hormigas de Fuego: Las aplicaciones al voleo controlarán la incursión de las hormigas de fuego y evitará que las colonias vecinas se vuelvan a arraigar en su césped. Para obtener mejores resultados, antes de aplicar este producto trate los hormigueros con un producto de control para hormigueros.

**Argentine, Southern, Field, Allegheny Mound, Florida Carpenter, Black Carpenter, Cornfield, Honey, Pavement, Red Imported Fire Ant, Nuisance

Fire Ant Note: Broadcast applications will control foraging fire ants and help prevent neighboring colonies from re-establishing in your lawn. For best results treat mounds with a mound control product prior to applying this product.

How to Apply

1. Determine size of area to be treated — measure length and width in feet, then multiply to determine coverage area in sq ft, then subtract non-lawn areas. This bag covers up to 5,000 sq ft.



2. Use the spreader setting chart and set spreader to appropriate setting.
3. Apply evenly over dry grass, avoiding streaking, skips and overlaps — thorough coverage is important.
4. Water in after application.
5. Keep children and pets off treated areas until this material is washed into turf and grass is dry.

It is important to follow directions as indicated on this quality lawn care product as over-application may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate. Differences may occur due to condition of spreader, speed at which applied, and roughness of area treated. Be sure to check spreader before beginning, adjusting if necessary. Consult owners' manual.

NEVER APPLY BY HAND

To avoid gaps and streaks, first spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk at a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn.

SPREADER SETTINGS: AJUSTES DEL ESPARCIDOR:

SPREADER	2.6 lb/1000 sq ft	4 lb/1000 sq ft
ROTARY SPREADERS ESPARCIDORES ROTATIVOS		
EARTHWAY 2050	8	11 1/2
SCOTTS SPEEDYGREEN 1000	4	5 3/4
SCOTTS SPEEDYGREEN 2000	4	5 3/4
SCOTTS SPEEDYGREEN 3000	4	5 3/4
VIGORO 4300	3	5 3/4
DROP SPREADERS ESPARCIDORES POR GOTEO		
SCOTTS ACCUGREEN 1000	5	7
SCOTTS ACCUGREEN 2000	5	7
SCOTTS ACCUGREEN 3000	5	7



**Mormigas Argentinas, del Sur, del Campo, de los Montes del Campo, de la Florida, Carpinteras Negras, del Maizal, de la Miel, de Pavimento, Coloradas de Fuego Importadas, Molestas

Nota sobre las Hormigas de Fuego: Las aplicaciones al voleo controlarán la incursión de las hormigas de fuego y evitará que las colonias vecinas se vuelvan a arraigar en su césped. Para obtener mejores resultados, antes de aplicar este producto trate los hormigueros con un producto de control para hormigueros.

Cómo Aplicarlo

1. Determine el tamaño de la superficie a tratar: mida el largo y el ancho en pies, luego multiplíquelos para determinar la superficie de cobertura en pies cuadrados y luego réstele las superficies sin césped. Esta bolsa cubre hasta 5,000 pies².
2. Utilice la tabla de ajustes del esparcidor para determinar el ajuste adecuado.
3. Aplique en forma pareja sobre el césped seco, evitando excesos, superposiciones y zonas sin aplicar; es importante lograr una cobertura completa.
4. Riegue después de la aplicación.
5. Mantenga los niños y las mascotas alejados de las áreas tratadas hasta que este material se absorba en el césped y hasta que el césped se seque.



Es importante seguir las instrucciones indicadas en este producto de calidad para el cuidado del césped, ya que una aplicación excesiva puede dañar su césped. Los ajustes del esparcidor son aproximados. Las diferencias pueden darse debido a la condición del esparcidor, la velocidad a la que se aplica el producto y la rugosidad de la superficie tratada. Asegúrese de verificar el esparcidor antes de comenzar y ajústelo si es necesario. Consulte el manual del propietario.

NUNCA APLIQUE CON LA MANO

Para evitar que queden huecos o excesos de aplicación, comience desde el borde del terreno y luego continúe hacia el centro con pasadas paralelas uniformes. Camine a un ritmo estable de modo que aplique el producto uniformemente sobre el césped.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store product in original container in a cool, dry, locked place out of reach of children and pets.

Disposal: if empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.

if partly filled: Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if swallowed. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

First Aid

if in Eyes:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
if Swallowed:	• Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor or going for treatment.

Environmental Hazards

This product is toxic to fish and highly toxic to other aquatic organisms including oysters and shrimp. Use with care when applying to turf areas adjacent to any body of water. Drift and runoff from treated turf may adversely affect aquatic organisms in adjacent aquatic sites. Do not apply directly to water. Do not apply when weather conditions favor drift from treated areas. Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment washwaters.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Almacene el producto en el contenedor original en un lugar fresco, seco y cerrado fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Eliminación: Si está vacío: No vuelva a utilizar este contenedor. Colóquelo en un basurero u ofrézcalo para reciclaje si el servicio está disponible.

Si está lleno en parte: Llame a la agencia de desechos sólidos de su zona o llame al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones acerca de cómo eliminar dichos desechos. Nunca coloque el producto que no se utilizó en un drenaje interior o exterior.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Peligroso para Humanos y Animales Domésticos

PRECAUCIÓN. Peligroso si se ingiere. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con ojos o ropa. Lave meticulosamente con agua y jabón después de manipular y antes de comer, beber, consumir goma de mascar o tabaco.

Primeros Auxilios

Si Penetra en los Ojos:	• Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 o 20 minutos. Quítense los lentes de contacto (si es que usa) después de los primeros 5 minutos, luego siga enjuagando los ojos. Llame a un Centro de Toxicología o a un médico para que le prescriba un tratamiento.
Si lo Ingiere:	• Llame de inmediato a un Centro de Toxicología o a un médico para que le prescriba un tratamiento. Si puede tragar, beba un vaso de agua. No provoque el vómito salvo que así se lo indiquen el Centro de Toxicología o el médico. No intente suministrar algo por boca a una persona inconsciente.

Tenga a mano el contenedor o la etiqueta del producto cuando llame al Centro de Toxicología o al médico, o cuando busque tratamiento.

Peligros Ambientales

Este producto es tóxico para los peces y altamente tóxico para otros organismos acuáticos como ostras y camarones. Úselo con cuidado al aplicar en áreas con césped adyacentes a cualquier masa de agua. La deriva o el desplazamiento pueden afectar en forma adversa a los organismos de sitios acuáticos adyacentes. No lo aplique directamente en el agua. No lo aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan la deriva del área tratada. No contamine el agua cuando limpie el equipo o cuando elimine el agua usada para la limpieza de los equipos.

AVISO: El comprador asume toda responsabilidad por la seguridad y el uso que no esté de acuerdo con las instrucciones.

Vigoro® Ultra Turf™ Summer Fertilizer Plus Insect Control 28-3-8

GUARANTEED ANALYSIS:

Total Nitrogen (N)	28.0%
1.18% Ammoniacal Nitrogen	
26.82% Urea Nitrogen*	
Available Phosphate (P ₂ O ₅)	3.0%
Soluble Potash (K ₂ O)	8.0%

Derived from: Polymer-coated Urea, Polymer-coated Sulfur-coated Urea, Urea, Ammonium Phosphate and Muriate of Potash.

*Contains 6.5% slowly available nitrogen from coated urea.

Distributed and guaranteed by Spectrum Group
Division of United Industries Corporation, PO Box 142642
St. Louis, MO 63114-0642

F1074

vigoro.com or 1-800-561-1333



Visit Us On The Internet
or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visitenos En El Internet
Para Información En Español

If you apply Vigoro Ultra Turf Summer Fertilizer Plus Insect Control 28-3-8 as directed and are not completely satisfied, send a proof of purchase from this package and the original cash register receipt to the address below. We will refund the purchase price you paid.

When applied as directed, this product meets the guidelines for metals adopted by the Association of American Plant Food Control Officials. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.regulatory-info-sb.com>.

Ultra Turf™ is a trademark of Martin Resources, Inc. and is used under license.

EPA Reg. No. 9688-220-8845

EPA Est. Nos. 9198-OH-1 (M), 9198-OH-2 (B), 9198-AL-1 (A), 49991-TX-1 (AZ), 49991-TX-2 (BC), 45065-MN-1 (BD), 59144-GA-1 (BE), 6665-NY-1 (BF), 35512-FL-2 (BG), 8378-IN-1 (AS), 43854-MO-1 (BH), 49710-TX-1 (AT), 49710-TX-3 (AU), 3234-UT-1 (AV), 3234-AZ-1 (AW), 8660-AL-1 (BN), 8660-OH-1 (BO), 74764-CA-1 (BK), 74764-FL-1 (BL), 9404-FL-1 (AX), 35497-OR-1 (AY)

Circled letter is first letter of lot number. 11-7467 North ©2005 UIC

