

# STOMADINE®

## Antiulcéreux

### Dans quel cas le médicament STOMADINE® est-il prescrit ?

C'est un antiulcéreux qui appartient à la famille des antihistaminiques de type H2 : ceux-ci agissent en bloquant l'action de l'histamine, qui stimule la sécrétion acide de l'estomac.

Il est utilisé dans le traitement :

- des inflammations de l'œsophage dues au reflux des acides de l'estomac vers l'œsophage,
- des ulcères de l'estomac ou du duodénum et pour prévenir les rechutes de l'ulcère du duodénum,
- du syndrome de Zollinger-Ellison.

En association avec un traitement antibiotique spécifique, ce médicament permet l'éradication d'un germe appelé Helicobacter pylori, très fréquemment responsable des récives de l'ulcère.

### Présentations du médicament STOMADINE®

**STOMADINE® 150 mg** : comprimé pelliculé; boîte de 30

### Composition du médicament STOMADINE®

	<b>p cp</b>
Ranitidine	150 mg

## Contre-indications du médicament STOMADINE®

Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

### Attention

La disparition des douleurs ne signifie pas que l'ulcère est cicatrisé : la durée du traitement doit être respectée.

Des précautions sont nécessaires en cas d'insuffisance rénale ou hépatique, ou d'antécédent de porphyrie.

Les comprimés effervescents contiennent du sel (sodium) en quantité notable.

## Interactions du médicament STOMADINE® avec d'autres substances

Si vous prenez des pansements digestifs, respectez un délai d'au moins 2 heures entre leur prise et la prise de ce médicament.

## Fertilité, grossesse et allaitement

### Grossesse :

Les données scientifiques actuellement disponibles n'ont pas mis en évidence de problème particulier lors de l'utilisation de ce médicament pendant la grossesse à la dose préconisée.

Néanmoins, ne l'utilisez pas sans avis médical.

### Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel : il est déconseillé pendant l'allaitement.

## Mode d'emploi et posologie du médicament STOMADINE®

Ce médicament peut être pris indifféremment au cours ou en dehors des repas.

### **Posologie usuelle :**

Traitement de l'inflammation de l'œsophage : 300 mg le soir, pendant 4 à 8 semaines.

Traitement des ulcères de l'estomac ou du duodénum : 300 mg le soir, pendant 4 à 6 semaines, puis 150 mg le soir.

Traitement de Zollinger-Ellison : la posologie est individuelle et beaucoup plus élevée.

Traitement destiné à l'éradication d'Helicobacter pylori : 2 comprimés à 150, matin et soir, associé à un traitement antibiotique pendant 14 jours ; puis 2 comprimés à 150 mg pendant 2 à 4 semaines. Le succès du traitement est étroitement lié au strict respect de la posologie de l'antiulcéreux et des antibiotiques pendant les 2 premières semaines.

### **Conseils**

Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme est un frein important au traitement ; la nicotine augmente l'acidité gastrique et réduit l'efficacité du muscle qui ferme la jonction entre l'œsophage et l'estomac.

La prise de ce médicament ne dispense pas des mesures diététiques que peut vous conseiller votre médecin.

L'aspirine et les anti-inflammatoires peuvent être agressifs pour l'estomac : n'en prenez pas sans l'avis de votre médecin.

### **Effets indésirables possibles du médicament STOMADINE®**

Rarement :

- nausées, diarrhée, constipation ;
- ralentissement cardiaque ;

- anomalies de la numération formule sanguine ;
- maux de tête, vertiges, fatigue ou excitation ;
- mouvements involontaires, état dépressif, confusion des idées particulièrement chez la personne âgée et l'insuffisant rénal ;
- douleurs musculaires, tension des seins, troubles de l'érection ;
- réaction allergique, éruption cutanée, chute des cheveux ;
- augmentation des transaminases, hépatite.