LakePak® WSP

Mode d'emploi

■ Généralités

LakePak® WSP est un concentré de bactéries patentées du genre *Bacillus* qui dégradent dans les plans d'eau, les éléments nutritifs en excédent, la matière organique et les hydrates de carbones. LakePak® WSP permet ainsi de réduire la prolifération d'algues, les odeurs de pourriture, ainsi que l'envasement. Il rend l'eau plus clair et de meilleure qualité. LakePak® WSP fait partie intégrante d'un plan de traitement des étangs. LakePak® WSP est inoffensif pour les poissons, les humains et autres animaux.

■ Dosage

Inoculation (1ère application)
1 sachet/200 m^3 ou 100 g/100 m^3

Maintenance (toutes les 2 semaines)
20 à 25 g/100 m^3

Attention : respecter le dosage recommandé. En cas de surdosage (5 fois et plus), l'eau peut se colorer plus ou moins fortement en brun-vert.

■ Emploi

Epandre et répartir la quantité de LakePak® WSP nécessaire sur la surface d'eau, par exemple avec un jet d'eau. Si le volume d'eau correspond, on peut lancer le sachet hydrosoluble telquel dans l'eau. Chaque année, au printemps, faire une 1ère application pour inoculer le plan d'eau (inoculation). Afin de maintenir cet inoculum tout au long de la saison, appliquer LakePak® WSP toutes les 2 semaines au dosage de maintenance. Pour les plans d'eau fortement encombrés en matières organiques et nutritives, augmenter le dosage de maintenance à 30-40 g/100 m^3.
La température de l'eau doit être supérieure à 10 °C et le pH entre 6 et 8. L'activité microbienne est plus lente à basses températures. Après une longue période de froid, le plan d'eau doit être réinoculé.
Une bonne aération favorise l'activité microbienne. Afin d'améliorer l'efficacité de LakePak® WSP, installer un système d'aération.
Prendre des mesures afin de réduire les apports d'éléments nutritifs et de matières organiques dans le plan d'eau.
LakePak® WSP est confectionné en emballage hydrosoluble : ne pas manipuler avec des mains humides ; ne pas stocker dans un lieu humide.
Ne pas mélanger LakePak® WSP avec des herbicides aquatiques ou des algicides à base de cuivre ou de bromide. En cas d'emploi de tels produits, le plan d'eau doit être réinoculé au plus tôt 7 jours après leur application.

■ Stockage

Conserver LakePak® WSP dans un endroit frais (10 à 15 °C) et sec, à l'abri du gel et de la lumière. L'emballage hydrosoluble devient friable s'il est stocké dans un endroit trop froid.